



دانلود رایگان  
نمونه سوالات  
پیام نور  
در سایت  
پی ان یو اگزام

[pnuexam.com](http://pnuexam.com)



دانشگاه پیام نور

رشته های فنی مهندسی | علوم پایه | روانشناسی | مدیریت | حقوق



[pnuexam\\_com](https://t.me/pnuexam_com)

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی / گد درس: روانشناسی (ستنی: ۱۳۱۷۰۲۹ - تجميع: ۱۳۱۷۰۶۱)  
 علوم تربیتی (تجميع: مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸)  
 گد سبوی سؤال: یک (۱) استفاده از: --- مجاز است.

امام خمینی (ره): این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

۱. عزت نفس پایین و نظر منفی نسبت به دیگران جزء کدامیک از نشانه‌های افسردگی است؟  
 الف. انگیزشی      ب. شناختی      ج. فیزیولوژیکی      د. هیجانی
۲. فلج ارادی جزء کدامیک از نشانه‌های افسردگی است؟  
 الف. انگیزشی      ب. شناختی      ج. فیزیولوژیکی      د. هیجانی
۳. اینکه افسردگی حاصل سه استوار درونی، کلی و پایدار است توسط کدام نظریه مطرح شده است؟  
 الف. درماندگی آموخته شده      ب. فروید  
 ج. رفتاری      د. درماندگی آموخته شده تجدید نظر شده
۴. کدام گزینه درباره شناخت درمانی صحیح است؟  
 الف. درمان رفتاری ریشه در درمان شناختی افسردگی دارد.  
 ب. شناخت درمانی در مقایسه با دارودرمانی اثر کمتری در افسردگی دارد.  
 ج. شناخت درمانی تنها راه بهبودی کامل افراد افسرده است.  
 د. عود افسردگی در افرادی که دارو درمانی شده اند بیش از افرادی است که شناخت درمانی شده اند.
۵. فرضیه ملاتونین و چرخه‌های شبانه‌روزی در تبیین سبب‌شناسی کدام اختلال بکار می‌رود؟  
 الف. افسردگی اساسی (ماژور)      ب. اختلال دو قطبی  
 ج. اختلال عاطفی فصلی      د. افسرده خوبی
۶. در کدامیک از اختلالات مزمن زیر فرد نشانه‌های افسردگی اساسی را بطور خفیف و هیپومانی را به صورت دوره‌ای تجربه می‌کند؟  
 الف. افسردگی یک قطبی      ب. اختلال ادواری خوبی      ج. اختلال عاطفی فصلی      د. دو قطبی نوع I
۷. آشفتگی‌های روانی - حرکتی مشخصه اصلی کدام نوع اسکیزوفرنیا است؟  
 الف. آشفته      ب. کاتاتونیک      ج. پارانوئید      د. باقی مانده
۸. کدامیک از گزینه‌های زیر بیانگر علائم منفی اسکیزوفرنیا است؟  
 الف. نقص در توجه و بی ارادگی      ب. هذیان و توهم  
 ج. رفتار آشفته      د. گفتار آشفته
۹. گزینه درست درباره شیوع شناسی و عوامل خطر ابتلا به بیماری اسکیزوفرنیا را مشخص کنید؟  
 الف. شیوع اسکیزوفرنیا در افراد متأهل بالاتر است.  
 ب. شیوع اسکیزوفرنیا در متولدین ماه آخر تابستان تا ماه اول زمستان بیشتر است.  
 ج. شروع بیماری ممکن است قبل از بلوغ باشد.  
 د. در طبقات اجتماعی - اقتصادی بالا شیوع بیشتر است.

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی: گد درس: روانشناسی (ستى: ۱۲۱۷۰۲۹ - تجميع: ۱۲۱۷۰۶۱)  
 علوم تربیتی (تجميع: مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸)  
 گد سبرى سؤال: يك (۱) استفاده از: -- مجاز است.

۱۰. آسیب به کدام ناحیه مغز، اسکیزوفرنی پارانوئید همراه با توهم شنوایی ایجاد می‌کند؟  
 الف. لوب گیجگاهی نیمکره راست  
 ب. لوب آهیانه ای نیمکره ای چپ  
 ج. لوب آهیانه ای نیمکره راست  
 د. لوب گیجگاهی نیمکره چپ
۱۱. کدامیک از موارد زیر جزء اثرات مواد محرک (کانابیس) بر افراد است؟  
 الف. افزایش توجه در اسکیزوفرنها  
 ب. ایجاد تجارب سایکوتیک  
 ج. جلوگیری از عود افسردگی  
 د. علت اصلی افسردگی
۱۲. امروزه کدامیک از روشهای زیر در درمان اسکیزوفرنیا کاربرد بسیار کمی دارد؟  
 الف. رفتار درمانی شناختی  
 ب. مداخلات خانوادگی  
 ج. دارو درمانی  
 د. ECT
۱۳. دو اختلال شخصیت خود شیفته و مرزی به ترتیب در کدامیک از جنسها شایع‌تراند؟  
 الف. زنان - زنان  
 ب. زنان - مردان  
 ج. مردان - زنان  
 د. مردان - مردان
۱۴. عقاید عجیب و غریب - بی‌ثباتی در روابط شخصی به ترتیب مربوط به کدام اختلالات شخصیت است؟  
 الف. اسکیزوتایپال - مرزی  
 ب. اسکیزوئید - اجتنابی  
 ج. مرزی - اسکیزوئید  
 د. اسکیزوتایپال - اسکیزوئید
۱۵. اینکه فردی از ارتباط نداشتن با دیگران ناراحت است در مقایسه با فردی که از ارتباط نداشتن با دیگران راضی می‌باشد، ملاک تشخیص افتراقی کدام اختلالات است؟  
 الف. ضداجتماعی - مرزی  
 ب. اسکیزوئید - مرزی  
 ج. اجتنابی - مرزی  
 د. اسکیزوئید - اجتنابی
۱۶. دسته دوم از اختلالات شخصیت با نشانه‌های کلی، هیجانی، خودنما و پرزرق و برق شامل چه اختلالاتی است؟  
 الف. ضد اجتماعی - نمایشی - خودشیفته - مرزی  
 ب. دوری گزین - وابسته - وسواسی - خودشیفته  
 ج. پارانوئید - اسکیزوئید - اسکیزوتایپال - نمایشی  
 د. دوری گزین - نمایشی - خودشیفته - بدخلق
۱۷. کارمندی که در انجام وظایف شغلی سازمان اختلال ایجاد می‌کند، بدون دلیل، رئیس سازمان را تحقیر می‌کند و به افرادی که خوشبخت‌تر و موفق‌تر هستند غبطه می‌خورد و برای ناراحتی آنها برنامه می‌ریزد، احتمال چه تشخیصی را برای این فرد در نظر می‌گیرید؟  
 الف. اختلال شخصیت پارانوئید  
 ب. اختلال شخصیت منفعل پرخاشگر  
 ج. اختلال شخصیت اجتنابی  
 د. اختلال شخصیت ضد اجتماعی
۱۸. مؤثرترین مداخلات روان‌شناختی در اختلالات شخصیت کدام است؟  
 الف. مداخلات معطوف به خانواده  
 ب. مداخلات معطوف به جامعه  
 ج. مداخلات در همسالان  
 د. مداخلات شغلی
۱۹. کدامیک از اختلالات شخصیتی با خصوصیت‌های شخصیتی تیپ A مطابقت دارد؟  
 الف. ضد اجتماعی  
 ب. مرزی  
 ج. وسواسی - اجباری  
 د. منفعل پرخاشگر

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی / گد درس: روانشناسی (سنی: ۱۲۱۷۰۲۹ - تجميع: ۱۲۱۷۰۶۱)  
 علوم تربیتی (تجميع: مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸)  
 گد سري سوال: يك (۱) استفاده از: -- مجاز است.

۲۰. کدام گزینه درباره اختلال بی‌اشتهایی روانی درست است؟  
 الف. تعداد مبتلایان در دو جنس یکسان است.  
 ب. اوج سن ابتلا ۱۸ تا ۲۵ سالگی است.  
 ج. شیوع اختلال در زنان طبقه اجتماعی پایین بیشتر است.  
 د. شیوع اختلال در زنان با تحصیلات بالاتر، بیشتر است.
۲۱. فوری ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی‌اشتهایی روانی کدام است؟  
 الف. خشکی مو  
 ب. ترک برداشتن پوست  
 ج. پوکی استخوان  
 د. از بین رفتن دوره های ماهیانه
۲۲. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی به چه علت از رفتارهای جبرانی استفاده می‌کنند؟  
 الف. جبران کالری بدن  
 ب. کاهش تنفر از خویشتن  
 ج. جلب توجه  
 د. انکار مشکلات
۲۳. نظریه نقطه تثبیت در علت شناسی اختلالات تغذیه ای با کدام گزینه زیر ارتباط دارد؟  
 الف. عملکرد هیپوتالاموس  
 ب. کاهش سروتونین  
 ج. علل روان شناختی  
 د. کانون توجه
۲۴. در رویکرد خانواده درمانی راسل و همکاران برای درمان بی‌اشتهایی روانی تکلیف آخر کدام است؟  
 الف. درگیر ساختن خانواده به درمان  
 ب. تغذیه مجدد  
 ج. ایجاد تغییراتی در کل سیستم خانواده  
 د. درگیرسازی مجدد
۲۵. درمان روان تحلیل گری بیماران مبتلا به پراشتهایی روانی میل به عینی سازی کدام مکانیسم دفاعی را دارد؟  
 الف. انکار و بازگشت  
 ب. والایش و تصعید  
 ج. درون فکنی و برون فکنی  
 د. جابجایی و مقاوم سازی
۲۶. حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز ملاک تشخیصی کدام اختلال زیر است؟  
 الف. پرخوابی اولیه  
 ب. بی خوابی اولیه  
 ج. آپنه  
 د. ناركولپسی
۲۷. در کدام نوع از اختلالات خواب فرد به طور ناگهانی از خواب بیدار می‌شود و فریاد می‌زند و گریه می‌کند و اغلب رویاهای دیده شده را به خاطر نمی‌آورد؟  
 الف. اختلال کابوس  
 ب. خواب گردی  
 ج. ناركولپسی  
 د. وحشت شبانه
۲۸. کدام روش در درمان بی‌خوابی اولیه تأثیر بیشتری دارد؟  
 الف. شرطی شدن مجدد  
 ب. درمان آرمیدگی  
 ج. دارودرمانی  
 د. روان تحلیل گری
۲۹. مهم ترین درمان ناركولپسی کدام است؟  
 الف. شرطی شدن مجدد  
 ب. درمان آرمیدگی  
 ج. دارودرمانی  
 د. شناخت درمانی



نام درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/ گاه درس: روانشناسی (ستنی: ۱۳۱۷۰۲۹ - تجمیع: ۱۳۱۷۰۶۱)  
 علوم تربیتی (تجمیع: مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸)  
 تعداد سوالات: تستی: ۴۰ نثری: --  
 زمان آزمون (حقیقه): تستی: ۵۵ نثری: --  
 سباز است. استفاده از: --

۳۰. اختلال در ارگانسیم مرد - واژینسیم - نمایشگری جنسی به ترتیب مربوط به کدام طبقه از اختلالات جنسی هستند؟  
 الف. بدکارکردی جنسی - پارافیلیاها - پارافیلیاها  
 ب. بدکارکردی جنسی - بدکارکردی جنسی - پارافیلیاها  
 ج. هر سه بدکارکردی جنسی هستند.  
 د. پارافیلیاها - پارافیلیاها - بدکارکردی جنسی
۳۱. کدام گزینه مربوط به اختلالات پارافیلیاها می‌باشند؟  
 الف. مالش دوستی - مازوخیسم جنسی - انزال زودرس  
 ب. مالش دوستی - سادیسم جنسی - تمایل جنسی به کودکان  
 ج. مقاربت دردناک - مالش دوستی - سادیسم جنسی  
 د. اختلال نعوظ - مالش دوستی - مازوخیسم جنسی
۳۲. در اختلال مبدل فروشی جنسی فرد در دوره‌های استرس زا، پوشش‌های زنانه را به عنوان وسیله‌ای دفاعی به تن می‌کنند که فرد با احیا کردن الگوهای وابستگی قبلی به آرامش می‌رسد. این تبیین به کدام مکانیزم دفاعی اشاره دارد؟  
 الف. سرکوبی ب. انکار  
 ج. جابجایی د. برگشت
۳۳. ملاک اصلی در تشخیص افتراقی اختلال هویت جنسی و اختلال مبدل پوشی جنسی در مردان چیست؟  
 الف. پوشیدن یا نپوشیدن لباس زنانه  
 ب. آزمایش هورمونی  
 ج. عملکرد اجتماعی  
 د. رضایت یا عدم رضایت از جنسیت خود
۳۴. در کدام اختلال زیر مقاومت به روان‌درمانی زیادتر است؟  
 الف. انزال زود رس ب. GID بزرگسالان  
 ج. اختلال نعوظ د. اختلال ارگانسیم
۳۵. در بیماری آلزایمر، فقدان حافظه و آسیب دیدن توانایی‌ها برای انجام اعمال علی‌رغم سالم بودن کارکردهای حرکتی به ترتیب به چه اصطلاحاتی معروف است؟  
 الف. آمنزی - آپراکسی ب. آمنزی - آفازی  
 ج. آمنزی - آگنوزی د. آمنزی - اختلال کارکردی
۳۶. نقش انتقال دهنده‌های عصبی در بروز بیماری آلزایمر در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟  
 الف. افزایش استیل کولین و کاهش سروتونین  
 ب. افزایش استیل کولین و افزایش سروتونین  
 ج. کاهش سروتونین و کاهش استیل کولین  
 د. کاهش استیل کولین و افزایش سروتونین
۳۷. مشکلات حافظه‌ای در مبتلایان به MS بیشتر به چه صورتی است؟  
 الف. بازیابی از حافظه دراز مدت  
 ب. بازیابی از حافظه کوتاه مدت  
 ج. سرعت پردازش اطلاعات  
 د. تفکر انتزاعی
۳۸. کندی حرکات ارادی، لرزش مداوم، عدم تعادل عمودی از نشانه‌های کدام اختلال عصب شناختی است؟  
 الف. ام اس ب. آلزایمر  
 ج. صرع د. پارکینسون
۳۹. شایع‌ترین اختلال روان‌شناختی در بیماران صرعی کدام است؟  
 الف. خلقی  
 ب. اضطرابی  
 ج. جسمانی شکل  
 د. شخصیت
۴۰. نارکولپسی در چه مدتی قابل تشخیص است؟  
 الف. ۳ ماه ب. ۶ ماه  
 ج. ۱۲ ماه د. ۵ هفته

نیمسال اول ۹۰-۸۹

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱		X			ب	عادی
۲	X				الف	عادی
۳			X		د	عادی
۴	X				د	عادی
۵				X	ب	عادی
۶			X		ب	عادی
۷		X			ب	عادی
۸	X				الف	عادی
۹				X	ب	عادی
۱۰	X				د	عادی
۱۱				X	ب	عادی
۱۲		X			د	عادی
۱۳	X				ب	عادی
۱۴				X	الف	عادی
۱۵	X				د	عادی
۱۶	X				الف	عادی
۱۷				X	ب	عادی
۱۸	X				الف	عادی
۱۹			X		ب	عادی
۲۰			X		د	عادی
۲۱	X				د	عادی
۲۲	X				ب	عادی
۲۳	X				الف	عادی
۲۴			X		ب	عادی
۲۵				X	ب	عادی
۲۶	X				د	عادی
۲۷		X			د	عادی
۲۸			X		الف	عادی
۲۹		X			ب	عادی
۳۰		X			ب	عادی
۳۱				X	ب	عادی
۳۲			X		د	عادی
۳۳			X		د	عادی
۳۴				X	ب	عادی
۳۵			X		الف	عادی
۳۶	X				ب	عادی
۳۷				X	الف	عادی
۳۸				X	د	عادی
۳۹				X	د	عادی
۴۰	X				الف	عادی

نام درس: آسیب روانی ۲  
 رشته تحصیلی / گد درس: روانشناسی ستنی ۱۲۱۷۰۲۹ (روانشناسی تجميع ۱۲۱۷۰۶۱)  
 (تجميع علوم تربیتی - مشاوره - ۱۲۱۱۰۹۸)  
 گد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: ---  
 مجاز است. ---  
 تعداد سؤالات: ستنی: ۳۰ نثری: ---  
 زمان آزمون (هفته): ستنی: ۵۵ نثری: ---

تنها با یاد اوست که دلها آرام می‌گیرد.

۱. نشانه اصلی اختلال‌های خلقی کدام است؟  
 الف. اضطراب      ب. مانیا      ج. افسردگی      د. کم خوابی
۲. این تبیین از افسردگی که: فرد یاد می‌گیرد محیط فیزیکی یا اجتماعی خارج از کنترل شخصی او است به کدام گزینه زیر مربوط است؟  
 الف. تبیین رفتاری      ب. درماندگی آموخته شده  
 ج. تبیین شناختی      د. تبیین روانکاو
۳. طبقه بندی خودکشی به سه نوع: بی‌هنجاری، نوع خواهانه و خودخواهانه براساس چه الگویی است؟  
 الف. اجتماعی      ب. روان تحلیل‌گری      ج. شناختی      د. انسان‌گرایانه
۴. دوره‌هایی از افسردگی به همراه هیپومانیا بیانگر کدام اختلال است؟  
 الف. دو قطبی نوع I      ب. دو قطبی نوع II      ج. ادواری خویی      د. افسردگی اساسی
۵. در کدام یک از نظریه‌های زیر مانیا واکنش دفاعی علیه افسردگی در نظر گرفته شده است؟  
 الف. رفتارگرایی      ب. روان تحلیل‌گری      ج. زیست‌شناختی      د. شناختی
۶. فردی که بعد از سخته پدرش، خود را مقصر می‌داند و به شدت احساس گناه می‌کند، از کدام خطای شناختی استفاده می‌کند؟  
 الف. بزرگ‌نمایی      ب. شخصی‌سازی      ج. استنباط دلخواه      د. انتزاع‌گزینشی
۷. نقص در توجه، بی‌ارادگی، فقدان لذت و بی‌حالتی از مشخصه‌های کدام علائم و یا کدام نوع اسکیزوفرنی است؟  
 الف. علائم منفی      ب. علائم مثبت      ج. نوع آشفته      د. کاتاتونیک
۸. نقطه اوج سن شروع اسکیزوفرنی در مردان و زنان چگونه است؟  
 الف. تفاوتی ندارد      ب. هر دو قبل از بلوغ است  
 ج. در زنان دیرتر است      د. بستگی به هوش دارد
۹. این جمله که اسکیزوفرنی در اثر نابهنجاری ناحیه خاصی بوجود نمی‌آید بلکه یکپارچگی فعالیت بین نواحی متفاوت مغزی آسیب می‌بیند به چه مفهومی اشاره دارد؟  
 الف. کارکرد ارتباطی      ب. کارکرد انفعالی      ج. بدکارکردی غیرفعال      د. بد ارتباطی کارکردی
۱۰. در مدل مقابله‌ای کدام نشانه از نشانه‌های اوایل شروع دوره اسکیزوفرنیا نمی‌باشد؟  
 الف. از دست دادن ساختار روزانه      ب. کناره‌گیری از دوستان و خانواده  
 ج. پرخوابی برای رهایی از استرس      د. صرف اوقات زیادی به تنهایی
۱۱. کدام نوع از اسکیزوفرنی از بقیه شایع‌تر است؟  
 الف. پارانوئید      ب. آشفته      ج. کاتاتونیک      د. باقی‌مانده

نام درس: آسیب روانی ۲  
 رشته تحصیلی / گد درس: روانشناسی ستی ۱۲۱۷۰۲۹ (روانشناسی تجميع ۱۲۱۷۰۶۱)  
 (تجميع علوم تربیتی - مشاوره - ۱۲۱۱۰۹۸)  
 گد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: --- مجاز است.

۱۲. در *DSM - IV - TR* چند خوشه و چند نوع اختلال شخصیتی مشخص شده است؟  
 الف. یک خوشه - ۸ نوع  
 ب. سه خوشه - ۸ نوع  
 ج. سه خوشه - ۵ نوع  
 د. یک خوشه - ۵ نوع
۱۳. روابط شخصی بی ثبات و شدید، آشفتگی هویتی و خودآسیب زنی عمدی عود کننده از نشانه های کدام اختلال شخصیت است؟  
 الف. ضد اجتماعی  
 ب. دوری گزین  
 ج. اسکیزوتایپال  
 د. مرزی
۱۴. به نظر شما شخصیت عبدالملک ریگی که دارای نشانه هایی از قبیل: فریبکاری، رفتارهای غیرقانونی، فقدان پشیمانی و ... به کدام تشخیص احتمالی زیر نزدیکتر است؟  
 الف. پارانویید  
 ب. اسکیزوتایپال  
 ج. مرزی  
 د. ضد اجتماعی
۱۵. کدام گزینه در تشخیص افتراقی دو اختلال اسکیزویید و دوری گزین درست تر است؟  
 الف. در اسکیزویید فرد از تنهایی خود ناراحت نیست ولی در دوری گزین برعکس.  
 ب. ارتباط برقرار کردن با افراد دوری گزین راحت تر از افراد اسکیزویید است.  
 ج. زمینه های ژنتیکی و خانوادگی در افراد اسکیزویید بیشتر و قوی تر است.  
 د. میزان نکانشگری در دوری گزینها به مراتب بیشتر از اسکیزوییدهاست.
۱۶. نشانه های مرتبط با کدام اختلال شخصیت زیر می تواند در یک سازمان مشکلات اداری و سازمانی ایجاد کند؟  
 الف. وسواسی - جبری  
 ب. اسکیزویید  
 ج. وابسته  
 د. منفعل - پرخاشگر
۱۷. استفراغ بعد از خوردن به منظور جلوگیری از افزایش وزن از ملاک های تشخیصی کدام اختلال است؟  
 الف. بی اشتهایی روانی  
 ب. پراشتهایی روانی  
 ج. چاقی مفرط  
 د. همه اختلالهای تغذیه
۱۸. تبیین زیست شناختی در مبتلایان به اختلالات تغذیه در کدام گزینه زیر درست است؟  
 الف. دوپامین پایین تر  
 ب. سروتونین پایین تر  
 ج. دوپامین بالاتر  
 د. سروتونین بالاتر
۱۹. اولین مرحله در رویکرد گارنر و بیز در درمان بی اشتهایی روانی چیست؟  
 الف. ایجاد یک توافق درمانی  
 ب. کشف طرحواره های عمیق  
 ج. تغییر شناخت بدی  
 د. رشد خودمختاری
۲۰. در کدام مرحله خانواده درمانی راسل و همکاران (برای درمان بی اشتهایی روانی)، روابط، ارتباطات حمایتی و قواعد تغذیه ای خانواده در سر یک سفره بررسی می شود؟  
 الف. مرحله درگیر ساختن خانواده  
 ب. مرحله تغییرات سیستمی  
 ج. مرحله تغذیه مجدد  
 د. مرحله سیستم مشاهده
۲۱. فوری ترین و بارزترین پیامد کنترل و کاهش وزن در بی اشتهایی روانی چیست؟  
 الف. مشکلات پوستی  
 ب. فشارخون پایین  
 ج. ضعف ایمنی بدن  
 د. آمنوریا



نام درس: آسیب روانی ۲  
 رشته تحصیلی / گد درس: روانشناسی ستنی ۱۲۱۷۰۲۹ (روانشناسی تجميع ۱۲۱۷۰۶۱)  
 (تجميع علوم تربیتی - مشاوره - ۱۲۱۱۰۹۸)  
 گد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: --- مجاز است.

۲۲. معمولاً چه نشانه‌ای در افراد چاق تحت درمان مشاهده می‌شود؟  
 الف. افسردگی و اضطراب خفیف  
 ب. وسواس  
 ج. اختلال خواب  
 د. اضطراب شدید
۲۳. بر اساس *DSM - IV - TR* بی‌خوابی اولیه چه مدت باید تداوم یابد تا تشخیص بگیرد؟  
 الف. یک هفته  
 ب. یک ماه  
 ج. دو ماه  
 د. سه ماه
۲۴. در کدام اختلال خواب فرد به طور معمولی بیدار می‌شود ولی وحشت زیادی تجربه می‌کند و اغلب رویای دیده شده را به خاطر نمی‌آورد؟  
 الف. کابوس  
 ب. خواب‌گردی  
 ج. وحشت شبانه  
 د. نارکولپسی
۲۵. مهم‌ترین روش درمانی اختلال نارکولپسی کدام است؟  
 الف. روان درمانی  
 ب. دارو درمانی  
 ج. E.C.T  
 د. نور درمانی
۲۶. کدام یک از اختلالهای زیر در طبقه اختلالهای دیس سومنیاها (بدخوابی‌ها) نیستند؟  
 الف. بی‌خوابی اولیه  
 ب. پرخوابی اولیه  
 ج. حمله خواب  
 د. خواب‌گردی
۲۷. اصلی‌ترین ملاک تشخیص نارکولپسی کدام است؟  
 الف. تجربه کاتاپلکسی  
 ب. حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز  
 ج. هیپنوپامپیک  
 د. هیپناگوژیک
۲۸. اختلال بیزاری جنسی در کدام طبقه از اختلالات جنسی طبقه بندی می‌شود؟  
 الف. میل جنسی  
 ب. لذت جنسی  
 ج. تحریک جنسی  
 د. درد جنسی
۲۹. هدف از برنامه درمانی مسترز و جانسون به نام تمرکز برآمدگی پذیرش حسی در اختلال نعوظی چیست؟  
 الف. ابراز احساسات  
 ب. بیش‌نظاره‌گری  
 ج. خود تحریکی  
 د. کاهش استرس از عمل جنسی
۳۰. گزینه درست را انتخاب کنید:  
 الف. در مبدل پوشی جنسی فرد هویت خود را قبول می‌کند ولی در اختلال هویت جنسی خیر  
 ب. در مبدل پوشی جنسی و اختلال هویت جنسی افراد هویت خود را قبول نمی‌کنند.  
 ج. اختلال مبدل پوشی جنسی زیر مجموعه اختلال هویت جنسی است.  
 د. هر دو اختلال با روان درمانی کامل درمان می‌شوند.
۳۱. انزال زودرس مربوط به کدام طبقه از اختلالات جنسی است؟  
 الف. میل جنسی  
 ب. تحریک جنسی  
 ج. اوج لذت جنسی  
 د. پارافیلیا
۳۲. کدام طبقه از اختلالات جنسی برای خود فرد، شریک جنسی یا برای جامعه مضر است؟  
 الف. بدکارکردی‌های جنسی  
 ب. خیال پردازیهای جنسی  
 ج. بیزاری جنسی  
 د. پارافیلیا

نام درس: آسیب روانی ۲  
 رشته تحصیلی / گد درس: (روانشناسی ستی ۱۲۱۷۰۲۹) (روانشناسی تجميع ۱۲۱۷۰۶۱)  
 (تجميع علوم تربیتی - مشاوره - ۱۲۱۱۰۹۸)  
 گد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: --- مجاز است.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ نثری: ---  
 زمان آزمون (فایله): تستی: ۵۵ نثری: ---

۳۳. درباره اختلال هویت جنسی مهم ترین نظریه پذیرفته شده کدام است؟

- الف. نظریه‌های شرطی شدن در مراحل اولیه زندگی  
 ب. نظریه شناختی  
 ج. نظریه زیست شناختی  
 د. روان تحلیل‌گری

۳۴. کدام یک از ویژگیهای زیر از ویژگیهای بیماری آلزایمر نمی‌باشد؟

- الف. آتاکسی ب. آمنزی ج. آفازی د. آکنوزیا

۳۵. مهم‌ترین انتقال دهنده عصبی مؤثر در آلزایمر کدام است؟

- الف. سروتونین ب. نورآدرنالین ج. استیل کولین د. دوپامین

۳۶. معروف‌ترین رویکرد روان شناختی در درمان آلزایمر کدام گزینه است؟

- الف. رفتار درمانی ب. رفتار درمانی شناختی  
 ج. خانواده درمانی د. تشخیص موقعیت واقعی

۳۷. حالات روان شناختی خشم و پارانویا در کدام نوع صرع دیده می‌شود؟

- الف. تشنجات هیستریک ب. صرع لوب گیجگاهی چپ  
 ج. صرع لوب گیجگاهی راست د. صرع لوب پیشانی

۳۸. کدام بیماری از تخریب غلاف میلین اطراف همه نرون‌های مغزی و سیستم اعصاب مرکزی ناشی می‌شود؟

- الف. M.S ب. دمانس ج. آلزایمر د. پارکینسون

۳۹. علایمی مثل کندی غیرطبیعی حرکات، رعشه، سفتی و آسیب به رفلکس‌های وضعی بدن مربوط به کدام اختلال زیر است؟

- الف. M.S ب. دمانس ج. آلزایمر د. پارکینسون

۴۰. شروع نوع بدخیم بیماری M.S در چه سنینی است؟

- الف. قبل از ۱۵ سالگی ب. بعد از ۳۰ سالگی ج. بعد از ۴۰ سالگی د. بعد از ۷۰ سالگی

نیمسال دوم ۹۰-۸۹

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادي					ج	۱
عادي					ب	۲
عادي					الف	۳
عادي					ب	۴
عادي					د	۵
عادي					ب	۶
عادي					الف	۷
عادي					ج	۸
عادي					د	۹
عادي					ج	۱۰
عادي					الف	۱۱
عادي					ج	۱۲
عادي					د	۱۳
عادي					د	۱۴
عادي					الف	۱۵
عادي					د	۱۶
عادي					ب	۱۷
عادي					ب	۱۸
عادي					الف	۱۹
عادي					ج	۲۰
عادي					د	۲۱
عادي					الف	۲۲
عادي					ب	۲۳
عادي					ج	۲۴
عادي					ب	۲۵
عادي					د	۲۶
عادي					ب	۲۷
عادي					الف	۲۸
عادي					د	۲۹
عادي					الف	۳۰
عادي					ج	۳۱
عادي					د	۳۲
عادي					الف	۳۳
عادي					الف	۳۴
عادي					ج	۳۵
عادي					د	۳۶
عادي					ب	۳۷
عادي					الف	۳۸
عادي					د	۳۹
عادي					ج	۴۰



تعداد سؤالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی سنتی (۱۲۱۷۰۲۹) - روان شناسی تجمیع (۱۲۱۷۰۶۱) - علوم تربیتی تجمیع (مشاوره و راهنمایی) (۱۲۱۱۰۹۸)

مجاز است

استفاده از:

۱. کدام یک از موارد زیر جزء نشانه‌های عصب- رفتاری تجربه شده بوسیله افراد دچار آسیب مغزی نمی‌باشد؟  
الف. بی‌قراری      ب. سردردها      ج. آسیب حافظه‌ای      د. خستگی
۲. نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟  
الف. ابرامسون      ب. سلیگمن      ج. آبل و همکاران      د. بک
۳. خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر نتیجه چیست؟  
الف. یاس و ناامیدی      ب. هذیان و توهم      ج. داروهای مصرفی      د. ناآرامی درونی
۴. خلق حاکم در حالت مانی کدام مورد زیر می‌باشد؟  
الف. حساسیت کم      ب. تحریک پذیری      ج. کم‌فعالی      د. ناآرامی درونی
۵. ویژگی اصلی اختلال شخصیتی اسکیزوئید کدام است؟  
الف. اجتناب از روابط نزدیک      ب. داشتن عقاید انتساب  
ج. کمال‌گرایی      د. تمایل به روابط نزدیک
۶. نام قدیمی شخصیت نمایشی، کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟  
الف. نارسیسیم      ب. هیستریک      ج. سایکوپات      د. اسکیزوفرنی
۷. عواملی که سبب ایجاد اختلال وابسته می‌شوند کدامند؟  
الف. ابتلاء به بیماری در دوره کودکی      ب. وجود والدین بسیار بی‌تفاوت  
ج. والدین سختگیر      د. والدین خشن
۸. برای درمان اختلال شخصیت مرزی از چه راهبردی استفاده می‌شود؟  
الف. آگاهی‌هیجانی      ب. دارایی  
ج. شناختی- رفتاری      د. زیستی
۹. رایج‌ترین نوع دمانس در کدام یک از گزینه‌های زیر آمده است؟  
الف. آنزایمر      ب. پارکینسون      ج. صرع      د. MS
۱۰. بیشترین درصد مبتلایان به بیماری آنزایمر در چه سنی هستند؟  
الف. بالای ۶۵ سال      ب. ۶۰ سال      ج. بالای ۸۰ سال      د. ۸۰ سال
۱۱. یکی از مشکلات مهم هم‌آیند با بیماری MS چیست؟  
الف. استرس      ب. افسردگی      ج. آشفتگی هیجانی      د. درماندگی آموخته شده
۱۲. در حملاتی که هوشیاری آسیب می‌بیند کدام نوع تشنج را مشخص می‌سازد؟  
الف. ساده      ب. پیچیده      ج. محدود      د. نوع کلی
۱۳. معروفترین درمان دارویی بیماری پارکینسون چیست؟  
الف. فلوکستین      ب. ال-دوپا      ج. ترازودن      د. داروهای بازدارنده جذب سروتونین



تعداد سؤالات: نسی: ۴۰ نثری: --

زمان آزمون (دقیقه): نسی: ۵۵ نثری: --

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی سنتی (۱۲۱۷۰۲۹) - روان شناسی تجمیع (۱۲۱۷۰۶۱) - علوم تربیتی تجمیع (مشاوره و راهنمایی) (۱۲۱۱۰۹۸)

مجاز است.

استفاده از:

۱۴. شایع ترین اختلال روان شناختی در بیماران صرعی چیست؟  
الف. اختلالات خلقی      ب. اختلالات شخصیتی      ج. افسردگی      د. اضطراب فراگیر
۱۵. نشانه‌های اصلی اختلال خلقی چیست؟  
الف. شادی بیش از حد      ب. رفتار مانیایی      ج. غمگینی مفرط      د. افسردگی
۱۶. سن معمولی برای شروع افسردگی چند سال می باشد و بیشتر در میان چه جنسی شایع می باشد؟  
الف. ۲۴ و ۲۹ ، زنان      ب. ۲۴ و ۳۹ ، مردان  
ج. ۲۰ و ۲۵ ، به طور مساوی      د. ۳۰ و ۳۵ ، زنان
۱۷. به نظر لوینسون و همکاران علت افسردگی چه چیزی می باشد؟  
الف. کاهش تماسهای اجتماعی      ب. پاداش به خاطر رفتارهای افسرده‌وار  
ج. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت      د. محیط خارج از کنترل شخص
۱۸. میزان خودکشی و مرگ و میر ناشی از خودکشی در میان چه جنسی بیشتر است؟  
الف. زنان- زنان      ب. مردان- زنان      ج. هر دو مساوی می باشند      د. زنان- مردان
۱۹. به نظر کراپلین کدام بیماری اغلب در نوجوانی، با دوره‌های طولانی از ناتوانی شدید اجتماعی و کارکرد مشخص می شود؟  
الف. اسکیزوفرنی      ب. جنون زودرس      ج. جنون مانیک- دپرسیو      د. روان گسیختگی
۲۰. به نظر کراپلین کدام مورد از محدودیتهای مفهوم جنون زودرس نمی باشد؟  
الف. هذیان و توهمات شدید مشخصه عود آن می باشد.  
ب. بیماری محدود به جوانترها نمی باشد.  
ج. در برخی افراد، بهبودی ایجاد می شود.  
د. همیشه به زوال عقلی ختم نمی شود.
۲۱. میزان کلی خودکشی در اسکیزوفرنیا در حدود چند درصد می باشد؟  
الف. ۲ تا ۱۰ درصد      ب. ۵ درصد      ج. ۵ تا ۱۰ درصد      د. ۱۰ درصد
۲۲. عوارض کلرپرومازین که به نشانه‌های خارج هرمی معروف می باشند کدام مورد می باشد؟  
الف. خشکی دهان و گلو      ب. نشانه‌های پارکینسون و حرکت پریشی دیررس  
ج. آشفته‌گی بینایی      د. آسیب مهم به سیستم ایمنی مهم
۲۳. اختلالات شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال در کدام طبقه از دسته بندی DSM-IV قرار می گیرد؟  
الف. هیجانی، خودنما و پرزرق و برق      ب. ترسو یا مضطرب  
ج. عجیب و غریب یا نامتعارف      د. فعل پذیر- پرخاشگر
۲۴. کدام اختلال به اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه معروف است؟  
الف. اسکیزوئید      ب. اسکیزوتایپال      ج. پارانویایی      د. مرزی



تعداد سؤالات: نسی: ۴۰ نثری: --

زمان آزمون (دقیقه): نسی: ۵۵ نثری: --

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی سنتی (۱۲۱۷۰۲۹) - روان شناسی تجمیع (۱۲۱۷۰۶۱) - علوم تربیتی تجمیع (مشاوره و راهنمایی) (۱۲۱۱۰۹۸)

مجاز است

استفاده از:

۲۵. نام دیگر اختلال شخصیت ضد اجتماعی چه می باشد؟
- الف. نارسیس      ب. هیستریک      ج. اسکیزوفرنی شبه نروتیک      د. سایکوپات
۲۶. کمک به درمانجو جهت کنار آمدن با مشکلات خانوادگی و خارج خانوادگی، شامل کدام نوع درمان برای اختلال شخصیت ضد اجتماعی می باشد؟
- الف. روان درمانی      ب. آموزش آگاهی هیجانی
- ج. رویکرد چند سیستمی مبتنی بر خانواده      د. بهبودی مشکلات ارتباطی
۲۷. طبق طبقه بندی DSM-TV چند درصد وزن بدن مبتلا به بی اشتهایی روانی از دست می رود؟
- الف. ۵ تا ۱۰ درصد      ب. ۱۵ درصد
- ج. ۱۰ درصد      د. ۱۵ تا ۲۰ درصد
۲۸. کدام گزینه در مورد پراشتهایی روانی صحیح نمی باشد؟
- الف. افراد مبتلا در مورد عدم جذابیت حساس و ترس از چاق شدن دارند
- ب. تلاشهای آنان برای مقابله با چاقی را کمتر از بی اشتهایان روانی است
- ج. دوره های پرخوری تکراری
- د. رفتارهای نامناسب جبرانی
۲۹. طبق نظریه زیست شناختی عامل ایجاد احساس گرسنگی چه چیزی می باشد؟
- الف. سطح پایین سر و تونین      ب. هیپوتالاموس شکمی
- ج. تعادل میان دو ناحیه هیپوتالاموس      د. هیپوتالاموس جانبی
۳۰. کدام مرحله از خواب Non-REM خواب عمیق نامیده می شود؟
- الف. مرحله اول      ب. مرحله دوم و سوم      ج. مرحله سوم و چهارم      د. مرحله چهارم
۳۱. دور باطل اضطراب - بی خوابی مربوط به کدام از انواع بد خوابی ها می باشد؟
- الف. بی خوابی اولیه      ب. حمله خواب
- ج. پر خوابی اولیه      د. بد خوابی
۳۲. بد خوابی و نابهنجاری های همراه خواب ناشی از کدام اختلال خواب می باشد؟
- الف. اختلال مربوط به اختلال روانی دیگر
- ب. اختلال های اولیه خواب
- ج. اختلال ناشی از یک بیماری جسمانی
- د. اختلال ناشی از مواد
۳۳. وقفه های تنفسی ۱۰ ثانیه ای موقتی که در طی خواب بوجود می آید چه نامیده می شود؟
- الف. نارکولپسی      ب. کابوس      ج. آپنه      د. وحشت شبانه



تعداد سوالات: ۴۰ نمره: --

زمان آزمون (دقیقه): نشت: ۵۵ نمره: --

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی سنتی (۱۲۱۷۰۲۹) - روان شناسی تجمیع (۱۲۱۷۰۶۱) - علوم تربیتی تجمیع (مشاوره و راهنمایی) (۱۲۱۱۰۹۸)

استفاده از:

مجاز است:

۳۴. در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال هویت جنسی، از کدام یک از روشهای روان درمانی استفاده نمی شود؟

الف. جلسات آموزش رفتارهای مربوط به هویت جنسی واقعی

ب. آموزش والدین

ج. استفاده از برنامه های رفتاری جهت تقویت رفتارهای مربوط به جنس واقعی

د. روان تحلیلی

۳۵. کدام مورد از اختلالات بدکاری جنسی از نظر جامعه مضر و نامناسب شمرده می شود؟

الف. پارافیلیاها ب. اختلال ناشی از مواد ج. اختلال تحریک جنسی د. اختلال مربوط به درد جنسی

۳۶. بهترین درمان مبدل پوشی کدام مورد می باشد؟

الف. روان درمانی ب. استفاده از داروی سیلدنافیل

ج. خانواده درمانی د. بیزار درمانی

۳۷. آشفتگی زبانی شامل کدام یک از ویژگیهای آلزایمر می باشد؟

الف. آمنزی ب. آپراکسی ج. آفازی د. آگنوزیا

۳۸. شروع MS به شکل بدخیم از چه سنی می باشد؟

الف. قبل از ۵۰ سالگی ب. ۴۰ سالگی ج. ۳۰-۴۰ سالگی د. ۶۰-۵۰ سالگی

۳۹. اولین اختلال شایع عصب شناختی کدام مورد می باشد؟

الف. صرع ب. صدمات سر ج. سکته د. پارکینسون

۴۰. ضایعات در کدام قسمت مغز ۹۰٪ موارد باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شنوایی می شود؟

الف. لوب تمپورال نیمکره چپ ب. لوب تمپورال طرف راست

ج. پرده لوب فرونتال د. بطن های مغزی

90-91-1

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحيح	وضعييت كليد
1				X	ب	عادي
2		X			ب	عادي
3		X			الف	عادي
4		X			ب	عادي
5	X				الف	عادي
6	X				ب	عادي
7	X				الف	عادي
8				X	الف	عادي
9	X				الف	عادي
10				X	ب	عادي
11		X			ب	عادي
12		X			ب	عادي
13		X			ب	عادي
14		X			ب	عادي
15		X			د	عادي
16	X				الف	عادي
17	X				ب	عادي
18				X	د	عادي
19		X			ب	عادي
20	X				الف	عادي
21				X	د	عادي
22		X			ب	عادي
23				X	ب	عادي
24		X			ب	عادي
25				X	د	عادي
26				X	ب	عادي
27		X			ب	عادي
28		X			ب	عادي
29				X	الف	عادي
30				X	ب	عادي
31	X				الف	عادي
32		X			ب	عادي
33				X	ب	عادي
34	X				د	عادي
35	X				الف	عادي
36				X	د	عادي
37				X	ب	عادي
38		X			ب	عادي
39				X	ب	عادي
40	X				الف	عادي



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهتمایی) چندبخشی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) (۱۳۹۷-۱۳۹۸) - روانشناسی چندبخشی (۱۳۹۷-۱۳۹۸)

- ۱- مؤثرترین درمان برای اختلال شخصیت ضداجتماعی متمرکز به کدام گزینه زیر است؟
۱. شناخت      ۲. خانواده      ۳. رفتار      ۴. دارو
- ۲- اصطلاح هبفرنیا به کدام نوع اسکیزوفرنیا گفته می شود؟
۱. پارانوئید      ۲. آشفته      ۳. کاتاتونیک      ۴. باقی مانده
- ۳- خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر در نتیجه چیست؟
۱. یأس و ناامیدی      ۲. هذیان و توهم      ۳. داروهای مصرفی      ۴. ناآرامی درونی
- ۴- به وضعیتی که در آن خلق فرد بین دوره هایی از افسرده خویی و رفتار هیپومانیاپی در نوسان است، چه گفته می شود؟
۱. اختلال عاطفی فصلی      ۲. اختلال افسرده مضاعف      ۳. اختلال ادواری خویی      ۴. اختلال دوقطبی
- ۵- خلق حاکم در حالت مانی کدام مورد زیر می باشد؟
۱. حساسیت کم      ۲. تحریک پذیری      ۳. کم فعالی      ۴. ناآرامی درونی
- ۶- از عواملی که سبب ایجاد اختلال وابسته می شود کدام مورد زیر است؟
۱. ابتلاء به بیماری در دوره کودکی      ۲. وجود والدین بسیار بی تفاوت      ۳. والدین سخت گیر      ۴. والدین خشن
- ۷- طبق طبقه بندی DSM-IV افسردگی همراه با مالیخولیا چه نامیده می شود؟
۱. افسردگی برون زاد      ۲. اختلال افسرده خویی      ۳. افسردگی مضاعف      ۴. افسردگی درون زاد
- ۸- بنظر لوینسون و همکاران عامل به وجود آورنده افسردگی چیست؟
۱. خلق پایین و کاهش رفتارهای مستحق پاداش      ۲. ایجاد برنامه نفع ثانوی      ۳. مورد توجه قرار گرفتن به خاطر رفتارهای افسرده وار      ۴. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت
- ۹- از ویژگیهای اصلی اختلال شخصیتی وسواسی- جبری کدام است؟
۱. اجتناب از روابط نزدیک      ۲. داشتن عقاید انتساب      ۳. کمال گرایی      ۴. تمایل به روابط نزدیک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) (۱۳۹۷-۱۳۹۸) - روانشناسی (چندبخشی) (۱۳۹۷-۱۳۹۸)

۱۰- در نظر کراپلین کدام بیماری با دوره هایی از عود مجدد و بهبودی نسبی مشخص می شود؟

۱. اسکیزوفرنی  
۲. جنون زودرس  
۳. جنون مانیک - دپرسیو  
۴. روان گسیختگی

۱۱- نامی که کراپلین برای اسکیزوفرنی نهاده بود چیست؟

۱. ذهن پاره پاره  
۲. دوپارگی  
۳. روان گسیختگی  
۴. زوال عقلی زودرس

۱۲- یکی از مشکلات مهم هم آیند با بیماری MS چیست؟

۱. استرس  
۲. افسردگی  
۳. آشفتگی هیجانی  
۴. درماندگی آموخته شده

۱۳- کدام نوع اسکیزوفرنی با شروع ناگهانی و با احتمال بهبودی زیاد مشخص می گردد؟

۱. اسکیزوفرنی با علائم مثبت  
۲. اسکیزوفرنی با علائم منفی  
۳. اسکیزوفرنی حاد  
۴. اسکیزوفرنی مزمن

۱۴- در کدام نوع حمله های تشنجی، هوشیاری آسیب می بیند؟

۱. ساده  
۲. پیچیده  
۳. محدود  
۴. نوع کلی

۱۵- معروفترین درمان دارویی بیماری پارکینسون چیست؟

۱. فلوکستین  
۲. ال - دوپا  
۳. ترازودن  
۴. داروهای بازدارنده جذب سروتونین

۱۶- ضایعات کدام قسمت مغز در ۹۰٪ موارد باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شنوایی می شود؟

۱. لوب تمپورال یک یا دو نیمکره  
۲. لوب پاریتال راست و چپ  
۳. لوبهای فرونتال  
۴. بطن های مغزی

۱۷- کم کاری فرونتالی در بیماران اسکیزوفرنیک بوسیله کدام مطالعه تصویربرداری حاصل می شود؟

۱. بررسی جریان خون ناحیه ای مغز  
۲. مطالعات الکتروفیزیک  
۳. تغییرات ساختاری  
۴. مطالعات نوروسایکولوژیک

۱۸- شایع ترین اختلال روان شناختی در بیماران صرعی چیست؟

۱. اختلالات خلقی  
۲. اختلالات شخصیتی  
۳. افسردگی  
۴. اضطراب فراگیر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) (۱۳۹۷-۱۳۹۸ - روانشناسی (چندبخشی) (۱۳۹۷-۱۳۹۸)

۱۹- نشانه اصلی اختلالات خلقی چیست؟

۱. شادی بیش از حد      ۲. رفتار مانیا      ۳. غمگینی مفرط      ۴. افسردگی

۲۰- به نظر بک علت افسردگی چیست؟

۱. کاهش تماسهای اجتماعی      ۲. شناخت های منفی  
۳. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت      ۴. محیط خارج از کنترل شخص

۲۱- کدام گزینه زیر از ویژگی های مشترک اختلالات شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال می باشد؟

۱. هیجانی، خودنما و پرزرق و برق      ۲. ترسو و مضطرب  
۳. عجیب و غریب یا نامتعارف      ۴. فعل پذیر- پرخاشگر

۲۲- کدام اختلال به اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه معروف است؟

۱. اسکیزوئید      ۲. اسکیزوتایپال      ۳. پارانویایی      ۴. مرزی

۲۳- مشکل آفرین ترین عوارض کلرپرومازین کدام است؟

۱. نشانه های خارج هرمی      ۲. خشکی دهان و گلو  
۳. خواب آلودگی      ۴. آشفتگی های بینایی

۲۴- کمک به درمانجو جهت کنار آمدن با مشکلات خانوادگی و خارج خانوادگی، شامل کدام نوع درمان اختلال شخصیت ضداجتماعی می باشد؟

۱. روان درمانی      ۲. آموزش آگاهی هیجانی  
۳. رویکرد چندسیستمی مبتنی بر خانواده      ۴. بهبودی مشکلات ارتباطی

۲۵- طبق طبقه بندی DSM-IV چند درصد وزن بدن مبتلاء به بی اشتهایی روانی از دست می رود؟

۱. ۵ تا ۱۰ درصد      ۲. ۱۵ درصد      ۳. ۱۰ درصد      ۴. ۱۵-۲۰ درصد

۲۶- اختلالات شخصیت پارانوئید دارای کدام ویژگی زیر است؟

۱. بدبینی نسبت به دیگران      ۲. حساسیت به نظم  
۳. هیجانات شدید      ۴. اجتناب از روابط نزدیک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) (۱۳۹۷-۱۳۹۸) - روانشناسی (چندبخشی) (۱۳۹۷-۱۳۹۸)

۲۷- کدام ناحیه هیپوتالاموس عامل ایجاد احساس گرسنگی می باشد؟

۱. هیپوتالاموس قدامی
۲. هیپوتالاموس شکمی
۳. تعادل میان دو ناحیه هیپوتالاموس
۴. هیپوتالاموس جانبی

۲۸- دور باطل اضطراب - بیخوابی مربوط به کدام نوع از انواع اختلالهای خواب می باشد؟

۱. بیخوابی اولیه
۲. حمله خواب
۳. پر خوابی اولیه
۴. بد خوابی

۲۹- وقفه های تنفسی ۱۰ ثانیه ای موقتی که در طی خواب بوجود می آید چه نامیده می شود؟

۱. نارکولپسی
۲. کابوس
۳. آپنه
۴. وحشت شبانه

۳۰- کدام گزینه در مورد اختلالهای تغذیه ای صحیح نمی باشد؟

۱. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی می توانند کالری مصرفی خود را تنظیم کنند.
۲. پیامدهای جسمانی پراشتهایی و بی اشتهایی روانی متفاوتند.
۳. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی تمایل به جلب رضایت دیگران دارند.
۴. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی مرضی بودن رفتارشان را می پذیرند.

۳۱- کدام اختلال شخصیتی به شخصیت های هیستریک معروف می باشند؟

۱. شخصیت نمایشی
۲. خودشیفته
۳. اسکیزوتایپال
۴. شخصیت ضداجتماعی

۳۲- کدام اختلال به اختلال شخصیت اجتنابی نیز معروف است؟

۱. وسواسی - جبری
۲. وابسته
۳. منفعل پرخاشگر
۴. دوری گزین

۳۳- استفراغ عمدی پس از خوردن غذا شامل کدام یک از اختلال های تغذیه ای می شود؟

۱. بی اشتهایی روانی
۲. بی اشتهایی از نوع محدود کننده
۳. پر اشتهایی روانی تخلیه ای
۴. پراشتهایی روانی

۳۴- کدام یک از علت های بی اشتهایی و پراشتهایی روانی به مجموعه ای از باورها و نگرش های تحریف شده نسبت به شکل و وزن بدن تأکید می کنند؟

۱. عوامل اجتماعی - فرهنگی
۲. مکانیسم های زیست شناختی
۳. تبیین روان تحلیل گری
۴. تبیین های روان شناختی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) (۱۳۹۷-۱۳۹۸ - روانشناسی (چندبخشی) (۱۳۹۷-۱۳۹۸)

۳۵- حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز که حداقل به مدت ۳ ماه دوام داشته باشند مربوط به کدام اختلال زیر می باشد؟

۱. ناركولپسی  
۲. اختلال خواب مرتبط با تنفس  
۳. پاراسومینا  
۴. پر خوابی اولیه

۳۶- رفتار عجیب و غریب فرد تا حدی که اطرافیان متوجه مشکل احتمالی فرد مبتلاء به آلزایمر بشوند مربوط به کدام مرحله از طول مدت بیماری می باشد؟

۱. دمانس شدید  
۲. دمانس متوسط  
۳. دمانس مبهم  
۴. دمانس خفیف

۳۷- بالا بودن سطح ماده شیمیایی گاما- اینترفرون در ایجاد کدام بیماری مؤثر شناخته شده است؟

۱. آلزایمر  
۲. صرع  
۳. پارکینسون  
۴. MS

۳۸- نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. ابرامسون  
۲. سلیگمن  
۳. آبل و همکاران  
۴. بک

۳۹- حالت خفیف تر اختلال افسردگی اساسی کدام اختلال می باشد؟

۱. اختلال افسرده خوبی  
۲. افسردگی درون زاد  
۳. مانیا (شیدایی)  
۴. اختلال ادواری خوبی

۴۰- کدام اختلال نورولوژیک زیر رایج ترین نوع دمانس است؟

۱. آلزایمر  
۲. پارکینسون  
۳. صرع  
۴. MS

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱				X	ب	عادي
۲				X	ب	عادي
۳	X				الف	عادي
۴		X			ج	عادي
۵		X			ب	عادي
۶			X		الف	عادي
۷				X	د	عادي
۸			X		د	عادي
۹			X		ج	عادي
۱۰				X	ج	عادي
۱۱				X	د	عادي
۱۲		X			ب	عادي
۱۳			X		ج	عادي
۱۴		X			ب، د	عادي
۱۵		X			ب	عادي
۱۶			X		الف	عادي
۱۷	X				الف	عادي
۱۸		X			ب	عادي
۱۹				X	د	عادي
۲۰				X	ب	عادي
۲۱			X		ج	عادي
۲۲	X				ب	عادي
۲۳	X				الف	عادي
۲۴		X			ج	عادي
۲۵		X			ب	عادي
۲۶	X				الف	عادي
۲۷				X	د	عادي
۲۸				X	الف	عادي
۲۹			X		ج	عادي
۳۰	X				الف	عادي
۳۱	X				الف	عادي
۳۲				X	د	عادي
۳۳			X		ج	عادي
۳۴		X			الف، د	عادي
۳۵	X				الف	عادي
۳۶				X	ج	عادي
۳۷				X	د	عادي
۳۸		X			ب	عادي
۳۹	X				الف	عادي
۴۰	X				الف، ج	عادي

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد فرس: علوم تربیتی (مشاوره و راهتمایی) چندبخشی ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) (۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی چندبخشی) (۱۳۱۷۰۶۱)

۱- نوسانات خلقی بیماران مبتلاء به اختلالات خلقی معمولاً با کدام دارو درمان می شود؟

۱. فلوکستین ۰۲. ایمی پرامین ۰۳. ال دوبا ۰۴. لیتیوم

۲- DSM-IV کدام نوع افسردگی را افسردگی همراه با مالیخولیا می نامد؟

۱. افسردگی برون زاد ۰۲. افسردگی درون زاد ۰۳. افسردگی اساسی ۰۴. افسردگی مضاعف

۳- مهمترین ناحیه مغزی دخیل در افسردگی کدام ناحیه است ؟

۱. لیمبیک ۰۲. تالاموس ۰۳. قشر مغز ۰۴. هیپوکامپ

۴- نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. ابرامسون ۰۲. سلیگمن ۰۳. بک ۰۴. آبلو و همکاران

۵- کدام یک از داروهای زیر جزء سه حلقوی ها نمی باشد؟

۱. فلوکستین ۰۲. آمی تریپتیلین ۰۳. دسی پرامین ۰۴. ایمی پرامین

۶- خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر در نتیجه چیست؟

۱. یأس و ناامیدی ۰۲. هذیان و توهم ۰۳. داروهای مصرفی ۰۴. ناآرامی درونی

۷- تبیین های سبب شناسی اختلال عاطفی فصلی عمدتاً بر چه اساسی قرار گرفته اند؟

۱. روان شناختی ۰۲. زیست شناختی ۰۳. شناختی ۰۴. روان تحلیل گری

۸- خلق حاکم در حالت مانی کدام مورد زیر می باشد؟

۱. حساسیت کم ۰۲. تحریک پذیری ۰۳. کم فعالی ۰۴. ناامیدی

۹- افراد مبتلا به اختلال ادواری خوبی شدیداً در معرض خطر ابتلا به کدام اختلال قرار دارند؟

۱. اختلال SAD ۰۲. اختلال دوقطبی ۰۳. اختلال افسردگی خوبی ۰۴. افسردگی اساسی

۱۰- شدیدترین اختلال روانی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. افسردگی ۰۲. اختلال دوقطبی ۰۳. اسکیزوفرنی ۰۴. اختلال شخصیت پارانویید

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهتمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) (۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (چندبخشی) (۱۲۱۷۰۶۱)

- ۱۱- شایع ترین نشانه اسکیزوفرنی حاد مربوط به کدام نشانه است؟
۱. فقدان بینش      ۲. اختلالات گفتاری      ۳. توهمات دیداری      ۴. عاطفه بی حالت
- ۱۲- بر اساس ملاک های تشخیص DSM-IV-TR نشانه های اسکیزوفرنیا در چه مدت قابل تشخیص می باشد؟
۱. ۶ هفته      ۲. ۱ ماه      ۳. ۳ ماه      ۴. ۲ هفته
- ۱۳- کدامیک از نروترانسمیترهای زیر در اسکیزوفرنیا نقش عمده ای دارد؟
۱. سروتونین      ۲. استیل کولین      ۳. اپی نفرین      ۴. دوپامین
- ۱۴- مصرف کدام یک از مواد زیر خطر ابتلاء به اسکیزوفرنی را افزایش می دهد؟
۱. آمفتامین      ۲. هروئین      ۳. حشیش      ۴. کوکائین
- ۱۵- کدام درمان زیر امروزه برای درمان اسکیزوفرنی کاربرد ندارد؟
۱. کلرپرمازین      ۲. الکترو شوک درمانی      ۳. کلوزاپین      ۴. هالوپریدول
- ۱۶- کدام یک از موارد زیر، در اسکیزوفرنیا دارو درمانی را بهبود می بخشد؟
۱. مدیریت استرس      ۲. تغییر باورها      ۳. خانواده درمانی      ۴. چالش کلامی
- ۱۷- شروع بیماری اسکیزوفرنیا مشخصاً بین چه سنینی صورت می گیرد؟
۱. ۲۰-۲۸ سالگی      ۲. ۲۰-۳۹ سالگی      ۳. ۲۰-۳۶ سالگی      ۴. ۱۸-۳۹ سالگی
- ۱۸- کدام اختلال های شخصیتی در مردان بیشتر است؟
۱. ضداجتماعی و خودشیفته      ۲. نمایشی و مرزی      ۳. ضداجتماعی و مرزی      ۴. نمایشی و خودشیفته
- ۱۹- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی مرزی محسوب نمی شود؟
۱. احساس خالی بودن      ۲. فرار از روابط نزدیک      ۳. آشفتگی هویت      ۴. خودآسیب زنی عمدی
- ۲۰- یک و همکاران در تبیین شان از اختلالات شخصیت چه نظرگاهی اتخاذ کرده اند؟
۱. روان تحلیل گری      ۲. زیستی      ۳. ژنتیکی      ۴. تکاملی
- ۲۱- نام قدیم شخصیت نمایشی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. نارسیسم      ۲. اسکیزوفرنی      ۳. سایکوپات      ۴. هیستریک



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد فرس: علوم تربیتی (مشاوره و راهتمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) (۱۲۱۷۰۲۹) - روانشناسی (چندبخشی) (۱۲۱۷۰۶۱)

- ۲۲- در کدام یک از اختلالات زیر تفکر خودکشی و تلاش هایی برای خودکشی رایج است؟
۱. اختلال پارانویایی  
۲. اختلال شخصیت مرزی  
۳. اختلال ضداجتماعی  
۴. خودشیفته
- ۲۳- کدام یک از اختلال های شخصیتی زیر با خصوصیات شخصیتی تیپ A مطابقت می کند؟
۱. وسواسی- جبری  
۲. وابسته  
۳. دوری گزین  
۴. منفعل- پرخاشگر
- ۲۴- بر اساس نظام DSM-IV سن تشخیص اختلالات شخصیت چه سنی است؟
۱. ۱۴ سالگی  
۲. ۱۸ سالگی  
۳. ۲۲ سالگی  
۴. ۲۵ سالگی
- ۲۵- بر اساس مدل پنج عاملی مکره، کدام یک از گزینه های زیر برای اختلال شخصیت ضداجتماعی مطرح شده است؟
۱. روان رنجور خوبی بالا  
۲. برون گرایی پایین  
۳. کمال گرایی  
۴. علاقه به تنهایی
- ۲۶- اصطلاح بی اشتهایی روانی توسط چه کسی و در چه سالی وارد قلمرو پزشکی شد؟
۱. مورتن ۱۶۹۴  
۲. گول ۱۸۷۴  
۳. فروید ۱۹۰۰  
۴. کراپلین ۱۸۲۴
- ۲۷- در بین مبتلایان به بی اشتهایی پرخوری - پاکسازی کدام یک از موارد زیر مشاهده می شود؟
۱. سوءمصرف مواد  
۲. اختلال کمبود توجه  
۳. تمارض  
۴. اختلال دوقطبی
- ۲۸- نظریه نقطه تثبیت به کدام قسمت مغز مربوط می شود؟
۱. تالاموس  
۲. هیپوتالاموس  
۳. هیپوکامپ  
۴. هیپوفیز
- ۲۹- چند درصد از واریانس رفتارهای بی اشتهایی را می توان به عوامل ژنتیکی نسبت داد؟
۱. ۴۵٪  
۲. ۵۵٪  
۳. ۶۵٪  
۴. ۷۵٪
- ۳۰- کدامیک از دارو های زیر برای هر دو اختلال های تغذیه ای سودمند است؟
۱. داروهای ضدافسردگی  
۲. داروهای ضدجنون  
۳. داروهای ضداضطراب  
۴. داروهای ضداستفراغ
- ۳۱- طبق برخی نظریه ها کدام نوع خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟
۱. REM  
۲. مرحله دوم  
۳. مرحله سوم  
۴. مرحله چهارم
- ۳۲- کابوس در کدام مرحله خواب روی می دهد؟
۱. non-REM  
۲. REM  
۳. مرحله اول  
۴. مرحله دوم

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد فرس: علوم تربیتی (مشاوره و راهتمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۱

۳۳- اصلی ترین ملاک تشخیص ناركولوپسی کدام يك از موارد زیر می باشد؟

۱. بیخوابی غیرقابل کنترل در شب  
۲. تجربه کاتاپلکسی (خشک زدگی)  
۳. حملات غیرقابل کنترل خواب در طول روز  
۴. توهمات هپناگوژیک

۳۴- کدام اختلال نشانگر فعال شدن دستگاه های فیزیولوژیایی در حین خواب است؟

۱. اختلال پر خوابی  
۲. دیس سومینا  
۳. اختلال اولیه خواب  
۴. پاراسومیناها

۳۵- مرحله اول جراحی اختلال هویت جنسی شامل کدام يك از گزینه های زیر می باشد؟

۱. تزریق هورمون جنس مقابل  
۲. روان درمان متمرکز به تغییر  
۳. تزریق تسترون  
۴. پروژسترون

۳۶- در سبب شناسی روان تحلیلی یادگار خواهی جنسی همراه با مبدل پوشی، کدام مکانیسم دفاعی قابل مشاهده است؟

۱. جابجایی  
۲. واکنش وارونه  
۳. برگشت  
۴. فرافکنی

۳۷- رایج ترین نوع دمانس، در کدام يك از گزینه های زیر آمده است؟

۱. صرع  
۲. آلزایمر  
۳. پارکینسون  
۴. MS

۳۸- رایجترین یافته در مغز بیماران صرعی چیست؟

۱. تجمع دوطرفه نرون های CA لایه پیرامیدال هیپوکامپ  
۲. فقدان دو طرفه نرون های CA لایه پیرامیدال هیپوکامپ  
۳. فقدان دو طرفه نرون های نیمکره های مغزی  
۴. تجمع دوطرفه نرون های نیمکره های مغزی

۳۹- بیماری پارکینسون معمولاً در بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. ۴۰-۷۰ سالگی  
۲. ۳۰-۶۰ سالگی  
۳. ۵۰-۸۰ سالگی  
۴. ۶۰-۹۰ سالگی

۴۰- صدمات سری که در آن جمجمه یا یافت مغزی فرد آسیب می بیند چه نامیده می شود؟

۱. صدمات بسته  
۲. ضربات مغزی بسته  
۳. آسیب مغزی  
۴. صدمات باز

91-92-1

1073741827

نمره نهايي پس از ورود بخش تشریحي، عملي و میان ترم محاسبه و در اطلاعات جامع دانشجو قابل مشاهده است

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	X				د	عادي
۲		X			ب.ب	عادي
۳			X		الف	عادي
۴		X			ب.ب	عادي
۵	X				الف	عادي
۶	X				الف	عادي
۷		X			ب.ب	عادي
۸		X			ب.ب	عادي
۹		X			ب.ب	عادي
۱۰			X		ج	عادي
۱۱	X				الف	عادي
۱۲		X			ب.ب	عادي
۱۳	X				د	عادي
۱۴			X		ج	عادي
۱۵		X			ب.ب	عادي
۱۶			X		الف	عادي
۱۷		X			ب.ب	عادي
۱۸	X				الف	عادي
۱۹		X			ب.ب	عادي
۲۰			X		د	عادي
۲۱			X		د	عادي
۲۲		X			ب.ب	عادي
۲۳	X				الف	عادي
۲۴		X			ب.ب	عادي
۲۵		X			ب.ب	عادي
۲۶		X			ب.ب	عادي
۲۷	X				الف	عادي
۲۸		X			ب.ب	عادي
۲۹			X		د	عادي
۳۰	X				الف	عادي
۳۱	X				الف	عادي
۳۲		X			ب.ب	عادي
۳۳			X		ج	عادي
۳۴			X		د	عادي
۳۵	X				الف	عادي
۳۶			X		ج	عادي

٣٧		X			ب.ب	عادي	٣٧
٣٨	X				ب.ب	عادي	٣٨
٣٩	X				الف	عادي	٣٩
٤٠				X	د	عادي	٤٠

pnuExam.com

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۳۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

۱- کدام یک از خطاهای منطقی زیر به نتیجه گیریهای منفی کلی درباره توانایی یا عملکرد گفته می شود؟

۱. استنباط دلخواه      ۲. شخصی سازی      ۳. تعمیم مفرط      ۴. انتزاع گزینشی

۲- اختلال ادواری خوبی حالت خفیفتر کدام اختلال می باشد؟

۱. اختلال افسردگی اساسی      ۲. اختلال دو قطبی  
۳. اختلال SAD      ۴. اختلال یک قطبی

۳- طبق نظریه روان تحلیلی فروید، افراد مستعد افسردگی در گذر از چه مرحله رشدی، با شکست مواجه شده اند؟

۱. مرحله جنسی      ۲. مرحله ادیپی      ۳. مرحله معقدی      ۴. مرحله دهانی

۴- در درمان اختلال عاطفی فصلی (SAD) با نور درخشان، نور چه تأثیری بر میزان ترشح ملاتونین دارد؟

۱. باعث کاهش مدت ترشح ملاتونین می شود.  
۲. باعث افزایش مدت ترشح ملاتونین می شود.  
۳. باعث اثرات متفاوتی در افراد متفاوت می شود.  
۴. مدت اثر ملاتونین را در بدن بیشتر می کند.

۵- مشکلات نعوظی در مردان و فقدان انگیزتگی جزء کدام دسته از نشانه های افسردگی است؟

۱. شناختی      ۲. فیزیولوژیکی      ۳. انگیزشی      ۴. شناختی- رفتاری

۶- جمله «همیشه برای من رخ می دهد» مربوط به کدام نوع اسناد است؟

۱. اسناد درونی      ۲. اسناد کلی      ۳. اسناد پایدار      ۴. اسناد کلی و پایدار

۷- کدام یک از گزینه های زیر جزء ۴ نشانه اصلی بلولر برای اسکیزوفرنی نمی باشد؟

۱. دوسوگرایی      ۲. ترجیح خیالپردازی به واقعیت  
۳. آشفتگی خلق      ۴. شکلی از التهاب مغزی بیحال کننده

۸- ویژگی نوع کاتاتونیک اسکیزوفرنیا در کدام گزینه آمده است؟

۱. آشفتگی روانی- حرکتی بارز      ۲. هذیانهای پارانوئیدی  
۳. آشفتگی های گفتاری      ۴. آشفتگی های خلقی

۹- شروع بیماری اسکیزوفرنیا مشخصاً بین چه سنینی صورت می گیرد؟

۱. ۲۰-۲۸      ۲. ۳۹-۲۰      ۳. ۲۰-۳۶      ۴. ۱۸-۳۹

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

- ۱۰- ضایعه در لوب تمپورال نیمکره چپ در بیشتر موارد چه اختلالی را ایجاد می کند؟
۱. اسکیزوفرنی نوع آشفته با خلق بیحالت  
۲. اسکیزوفرنی نوع کاتاتونیک با آشفتگی گفتاری  
۳. اسکیزوفرنی نوع باقی مانده با فقدان هذیانها  
۴. اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شنوایی
- ۱۱- براساس مطالعات تغییرات ساختاری در بخش فرونتال مغز، حجم کوچکتر گیروس استریت با کدام یک از موارد زیر ارتباط دارد؟
۱. اختلال در تفکر  
۲. ناسازگاری اجتماعی  
۳. توهمات شنوایی  
۴. رفتار آشفته
- ۱۲- کدام یک از جملات زیر در مورد نظریه فروم- ریچمن در مورد اسکیزوفرنی صحیح است؟
۱. پایگاه اجتماعی- اقتصادی به عنوان یک عامل خطر ابتلا به اسکیزوفرنی عمل می کند.  
۲. اسکیزوفرنیا یک عامل سقوط به پایگاه اجتماعی پایین تر است.  
۳. اسکیزوفرنیا پیامد پرورش مادری که به نظر فداکار و صمیمی است اما در واقع خودمحور و سرد است.  
۴. والدین غالباً با کودکان خود به شیوه های متضاد و سردرگم برخورد می کنند.
- ۱۳- اختلالات شخصیت در کدام محور DSM-IV-TR مورد تشخیص واقع می شوند؟
۱. محور اول  
۲. محور سوم  
۳. محور چهارم  
۴. محور دوم
- ۱۴- براساس مدل پنج عاملی مکره، کدام یک از گزینه های زیر برای اختلال شخصیت ضداجتماعی مطرح شده است؟
۱. روان رنجورخویی بالا  
۲. برون گرایی پایین  
۳. کمال گرایی  
۴. علاقه به تنهایی
- ۱۵- همه گیرشناسی میزان شیوع اختلالات شخصیت پارانوئیدی چند درصد است؟
۱. ۱ تا ۴ درصد  
۲. ۳ تا ۴ درصد  
۳. ۰/۵ تا ۲/۵ درصد  
۴. ۲ تا ۳ درصد
- ۱۶- مکانیسم دفاعی اصلی شخصیتهای نمایشی چیست؟
۱. واپس زدن  
۲. تجزیه  
۳. فرافکنی  
۴. گزینه ۱ و ۲ صحیح است.
- ۱۷- حجم ماده خاکستری پره فرونتال افرادی که به اعمال ضداجتماعی اشتغال داشتند چه تغییری نشان می دهد؟
۱. کاهش می یابد.  
۲. افزایش می یابد.  
۳. تغییری نمی کند.  
۴. رشد نمی کند.

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

۱۸- از نظر راث و همکاران برای افراد مبتلاء به اختلال شخصیت که سن پایین تر از ۳۰ سال دارند، مهمترین مسئله احتمال چه حرکتی است؟

۱. افسردگی ۲. خودکشی ۳. خود آسیب زنی ۴. روانپریشی

۱۹- افکار خرافی، تفکر سحرآمیز، عقاید انتساب، اشتباه حسی و مسخ واقعیت قسمتی از دنیای روزمره افراد مبتلا به کدام اختلال شخصیت زیر است؟

۱. اختلال شخصیت نمایشی ۲. اختلال شخصیت اسکیزوتایپال  
۳. اختلال شخصیت اسکیزوتیوید ۴. اختلال شخصیت پارانوئید

۲۰- اختلال بی اشتهایی و پراشتهایی روانی معمولاً از چه زمانی بروز می کند؟

۱. پس از یک دوره رژیم سخت غذایی در افرادی که از چاق شدن می ترسند.  
۲. بعد از قرار گرفتن در موقعیت اضطراب آور.  
۳. وقتی افراد از لاغری مفرط در عذاب باشند.  
۴. از زمانی که رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

۲۱- ۸۰ تا ۹۰ درصد مبتلایان به بی اشتهایی روانی را افراد کدام گزینه زیر تشکیل می دهند؟

۱. زنان ۲. جوانان ۳. مردان ۴. افراد سالخورده

۲۲- مهمترین پیامد سوءمصرف ملینها و استفرغهای مکرر در پراشتهایی روانی چیست؟

۱. عدم تعادل الکترولیت ها ۲. از دست دادن آب بدن  
۳. آسیب شکمی ۴. مشکلات گوارشی

۲۳- براساس طرحواره های خویشتن مربوط به وزن، اشخاص چگونه ارزیابی می شوند؟

۱. براساس صلاحیت فردی ۲. براساس چاقی یا لاغریشان  
۳. با افکار و احساساتشان ۴. براساس تجارب

۲۴- پر استفاده ترین رویکرد شناختی- رفتاری در درمان بی اشتهایی روانی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. گال ۲. بنت ۳. گارنرو بیز ۴. راسل و همکاران

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

۲۵- کدام نوع خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟

۱. non-REM  
۲. مرحله چهارم non-REM  
۳. مرحله دوم خواب non-REM  
۴. REM

۲۶- کدام یک از روشهای زیر، شیوه مؤثری در درمان بیخوابی اولیه است؟

۱. درمان آرمیدگی  
۲. شرطی شدن مجدد  
۳. درمان مجدد محدودسازی خواب  
۴. دارو درمانی

۲۷- اصلی ترین ملاک تشخیص نارکولوپسی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز  
۲. توهمات هپناگوژیک  
۳. تجربه کاتاپلکسی (خشکزدگی)  
۴. حملات قابل کنترل در طول روز

۲۸- کدام گزینه در مورد تبیین روان تحلیلی اختلالات تغذیه ای صحیح است؟

۱. از طریق اعمال خود انضباطی غیرعادی است که بیمار بی اشتها احساس خودمختاری می کند.  
۲. مبتلایان به پراشتهایی روانی بر فراخود کنترل دارند.  
۳. مبتلایان به بی اشتهایی روانی قدرت الگوی بیشتری دارند.  
۴. تثبیت در مرحله مقعدی صورت می گیرد.

۲۹- در اختلال خواب مرتبط با تنفس، در طول یک شب باید چند آپنه وجود داشته باشد تا قابل تشخیص شود؟

۱. ۱۰ آپنه  
۲. ۲۰ آپنه  
۳. ۳۰ آپنه  
۴. ۵۰ آپنه

۳۰- برای درمان وحشت شبانه و خوابگردی چه عواملی دارای اهمیت است؟

۱. بررسی وضعیت زندگی و خانوادگی  
۲. بررسی سوابق خوابگردی  
۳. بررسی طول مدت ابتلاء به این اختلالها  
۴. بررسی تاریخچه بیماری

۳۱- کدام یک از موارد زیر جزء طبقات کلی روانشناسان و روانپزشکان از اختلالهای جنسی نمی باشد؟

۱. بدکارکردی جنسی  
۲. اختلال هویت جنسی  
۳. اختلالات جنسی  
۴. پارافیلیاها

۳۲- زمانی که انقباض غیرارادی قسمت خارجی اندام تناسلی زن مانع از آمیزش جنسی میگردد، کدام اختلال مدنظر است؟

۱. اختلال اوج لذت جنسی  
۲. واژینیسم  
۳. اختلال میل جنسی کم کار  
۴. مقاربت دردناک



تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

- ۳۳- در تبیین شناختی اختلال نعوظی، ۲ پیامد بیش نظاره گری واحد (توسط مسترز و جانسون) مطرح شده اند، کدام اند؟  
 ۱. اضطراب و خشم ۲. استرس و ترس ۳. خشم و ترس ۴. ترس و اضطراب
- ۳۴- نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به GID چه اشتغال ذهنی در مورد جنسیتشان دارند؟  
 ۱. معتقدند که با یک جنسیت غلط به دنیا آمده اند.  
 ۲. از اندامهای جنسی، جنس مقابل متنفرند.  
 ۳. احساس جذابیت نمی کنند.  
 ۴. به تغییر جنسیت عمل جراحی فکر می کنند.
- ۳۵- در کدام اختلال بیمار به وسیله استفاده از اشیای بیجان (مثل لباس زیر زنانه) به ارضای تمایلات جنسی خود می پردازد؟  
 ۱. یادگارخواهی همراه مبدل پوشی ۲. یادگارخواهی جنسی  
 ۳. اختلال جنسی مالش دوستی ۴. نمایشگری جنسی
- ۳۶- «عدم توانایی تشخیص و شناسایی اشیاء، علیرغم سالم بودن کارکردهای حسی» چه نامیده می شود؟  
 ۱. آنزری ۲. آپراکسی  
 ۳. آگنوزیا ۴. اختلال در کارکردهای اجرایی
- ۳۷- در کدام نوع دمانس، در وجود بیماری جای شکی نمی ماند اما بیماری میتواند استقلال خود را حفظ کند؟  
 ۱. نوع خفیف ۲. نوع مبهم ۳. متوسط ۴. نوع شدید
- ۳۸- کاهش کدام انتقال دهنده های عصبی در بیماری آلزایمر می تواند سهم عمده ای در آشفتگی حسی و رفتار پر خاشجویانه داشته باشد؟  
 ۱. استیل کولین و دوپامین ۲. سروتونین و نورآدرنالین  
 ۳. استیل کولین و سروتونین ۴. سروتونین و دوپامین
- ۳۹- همراهی علائم روانی با بیماری پارکینسون چند درصد برآورد شده است؟  
 ۱. ۱۵ الی ۲۵ درصد ۲. ۱۵ الی ۲۰ درصد ۳. ۳۰ الی ۵۰ درصد ۴. بیش از ۵۰ درصد
- ۴۰- علامت A در مدل IDEAL مربوط به کدام گزینه می باشد؟  
 ۱. عمل براساس طرح قبلی ۲. تشخیص مسأله  
 ۳. تعریف مسأله ۴. واری ائرمندی طرح

91-92-2

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحيح
١			X		عادي
٢	X				عادي
٣				X	عادي
٤	X				عادي
٥		X			عادي
٦			X		عادي
٧	X				عادي
٨	X				عادي
٩			X		عادي
١٠			X		عادي
١١			X		عادي
١٢			X		عادي
١٣	X				عادي
١٤		X			عادي
١٥			X		عادي
١٦			X		عادي
١٧		X			عادي
١٨		X			عادي
١٩	X				عادي
٢٠		X			عادي
٢١		X			عادي
٢٢		X			عادي
٢٣	X				عادي
٢٤			X		عادي
٢٥			X		عادي
٢٦			X		عادي
٢٧	X				عادي
٢٨		X			عادي
٢٩	X				عادي
٣٠	X				عادي
٣١		X			عادي
٣٢		X			عادي
٣٣				X	عادي
٣٤	X				عادي
٣٥	X				عادي
٣٦	X				عادي
٣٧		X			عادي
٣٨			X		عادي
٣٩		X			عادي
٤٠			X		عادي

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰  
سری سوال: یک ۱  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

۱- افسردگی بهنجارچه تفاوتی با افسردگی یک قطبی دارد؟

۱. نشانه های بهنجار کمتر ولی طولانی تر است.
۲. نشانه های بهنجار شدیدترند.
۳. نشانه های یک قطبی شدیدتر و فراوان ترند.
۴. نشانه های یک قطبی خفیف تر ولی طولانی ترند.

۲- نشانه های شناختی افسردگی از دیدگاه بک (Beck) چه موردی را شامل نمی شود؟

۱. نظر منفی نسبت به خود
۲. نظر منفی نسبت به دیگران
۳. نظر منفی نسبت به آینده
۴. نظر منفی نسبت به گذشته

۳- افراد مبتلا به اختلال افسرده خویی دست کم به چه مدتی به برخی از نشانه های افسردگی اساسی مبتلا می شوند؟

۱. ۲ سال
۲. ۲ ماه
۳. ۲ روز
۴. ۲ هفته

۴- چنانچه یک فرد مبتلا به افسردگی، در تمرکز به یک امر جزیی بی اهمیت منفی درعین حال به نادیده گرفتن ویژگی های مثبت مهم تر اقدام نماید، کدام یک از پنج خطای منطقی را انجام داده است؟

۱. تعمیم مفرط
۲. شخصی سازی
۳. انتزاع گزینشی
۴. استنباط دلخواهی

۵- کدام دسته از روانشناسان اعتقاد دارند که مانیا یک مکانیسم دفاعی افراطی در مواجهه با حالات هیجانی ناخوشایند یا تکانه های نامقبول می باشد؟

۱. رفتارگرایان
۲. شناخت گرایان
۳. زیست شناخت گران
۴. روان تحلیلگران

۶- این اختلال حداقل ۲ سال ادامه دارد و فردنشانه های افسردگی اساسی را به طور خفیف و هیپومانیا را به صورت دوره ای تجربه می نماید؟

۱. دو قطبی نوع I
۲. ادواری خویی
۳. دو قطبی نوع II
۴. افسردگی فصلی

۷- از دیدگاه این دانشمند چهار نشانه اصلی اسکیزوفرنی عبارتند از: دوسوگرایی، آشفتگی تداعی ها، آشفتگی خلق و خیال پردازی؟

۱. بلولر
۲. کراپلین
۳. فروید
۴. بک

۸- نشانه های مثبت اسکیزوفرنی عبارتند از:

۱. هذیان - توهم
۲. فقدان تکلم - نقص توجه
۳. گفتار حاشیه ای - فقدان لذت
۴. خلق بی حالت - بی ارادگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

۹- در این نوع از اسکیزوفرنی تهییج افراطی، بهت و انعطاف مومی شکل دیده می شود؟

۱. هفتریا      ۲. پارانوئید      ۳. کاتاتونیک      ۴. باقی مانده

۱۰- شایعترین نشانه ی اسکیزوفرنی حاد که این بیماری را از بسیاری دیگر از اختلالات متمایز می کند چیست ؟

۱. گفتار آشفته      ۲. شروع ناگهانی و بهبودی زیاد  
۳. تفکرات آشفته      ۴. شروع آرام و پیش آگهی بد

۱۱- طبق نظر فارل و شاو افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در چه زمینه ای مشکل دارند ؟

۱. در تفکر      ۲. در حافظه  
۳. در مهارت های فرا شناختی      ۴. ناتوانی در فهم و توصیف حالت های هیجانی

۱۲- مشخصه های بالینی خاصی که با پیش آگاهی ضعیف برای تشخیص اسکیزوفرنی به کار می رود عبارتند از؟

۱. طبقه اجتماعی بالا- جنسیت مونث - وجود مولفه برجسته  
۲. شروع دیررس - جنسیت مونث - نشانه های مثبت  
۳. طبقه اجتماعی متوسط - IQ بالا - جنسیت مذکر  
۴. شروع زودرس - جنسیت مذکر - نشانه های منفی

۱۳- براساس این مدل روانشناختی مبتلایان به اسکیزوفرنیا در مواجهه با استرس های زندگی از راهبردهای مقابله ای ضعیف تری استفاده می کنند؟

۱. مدل ضربه ای روانی و توهمات      ۲. مدل شناختی هذیان ها  
۳. مدل مقابله ای      ۴. مدل زیست روانشناختی

۱۴- براساس مهمترین یافته های عکس برداری از مغز کاهش حجم کورتکس در کدام نواحی با اسکیزوفرنی ارتباط بیشتری دارد؟

۱. لوب پیشانی - پس سری      ۲. لوب گیجگاهی - پیشانی  
۳. لوب پیشانی - آهیانه ای      ۴. لوب گیجگاهی - آهیانه ای

۱۵- افراد مبتلا به اختلال شخصیت، حداقل در چند مورد از انتظارات فرهنگی دچار انحراف هستند؟

۱. یک مورد      ۲. دو مورد      ۳. سه مورد      ۴. چهار مورد

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

۱۶- اختلال شخصیت خودشیفته و مرزی جزء کدام دسته از اختلالات شخصیت قرار می گیرند؟

۱. دسته سوم - عجیب و غریب  
۲. دسته دوم - هیجانی  
۳. دسته سوم - مضطرب  
۴. دسته دوم - ترسو

۱۷- براساس مدل شناختی بک این باور که من اساساً یک فرد تنها هستم و زمانیکه تنها هستم دارای کارایی بیشتر هستم ، مربوط به کدام نوع از اختلالات شخصیت می باشد؟

۱. شخصیت ضد اجتماعی  
۲. شخصیت نمایشی  
۳. شخصیت اسکیزوتیید  
۴. شخصیت وابسته

۱۸- مکانیسم دفاعی اصلی در شخصیت های نمایشی چیست ؟

۱. واپس زدن و تجزیه  
۲. انکار  
۳. والایش  
۴. پالایش

۱۹- از نظر سبب شناسی چه عاملی شخصیت سایکوپات را از شخصیت ضداجتماعی متمایز می کند؟

۱. افکار دوگانه  
۲. هیجانان ضعیف و مشکلات خستگی  
۳. گسلس هیجانی - عمق محدود هیجانان  
۴. شکایتهای جسمانی و مکانیسم های دفاعی

۲۰- در نظام طبقه بندی ICD-10، از کدام اختلال شخصیت به عنوان اختلال شخصیت هیجانی بی ثبات نام برده می شود؟

۱. اسکیزوتایپال  
۲. ضداجتماعی  
۳. نمایشی  
۴. مرزی

۲۱- هدف اولیه درمان برای افراد دارای اختلال شخصیت زیر ۳۰ سال چیست ؟

۱. کنترل هیجانان  
۲. مدیریت رفتار  
۳. پیشگیری از خودکشی  
۴. ایجاد حمایت اجتماعی

۲۲- سطوح بالای تکانشی بودن ، تحریک پذیری ، پرخاشگری و در جستجوی هیجان بودن در اختلال شخصیت ضد اجتماعی با کدام انتقال دهنده عصبی رابطه دارد؟

۱. سرونونین  
۲. آدرنالین  
۳. دوپامین  
۴. نورآدرنالین

۲۳- در کدام نوع از اختلال بی اشتهاهی روانی ، اختلال شخصیت و کنترل تکانه مشاهده می شود؟

۱. محدودکننده  
۲. پرخوری - پاکسازی  
۳. پرخوری محدود کننده  
۴. محدودکننده - پاکسازی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰: تشریحی: ۰  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

۲۴- مهم ترین پیامد رفتارهای جبرانی در اختلال پراشتهایی روانی چیست ؟

۱. مشکلات گوارشی  
 ۲. عدم تعادل الکترولیت  
 ۳. دردهای شکمی  
 ۴. آسیب دندان ها

۲۵- از نظر روان تحلیل گران علت بی اشتهائی روانی در نوجوانان در کدام گزینه ذکر نشده است ؟

۱. کسب استقلال بیشتر  
 ۲. افزایش عملکرد اجتماعی  
 ۳. افزایش عملکرد جنسی  
 ۴. اختلال شناختی

۲۶- براساس مطالعات ۲۱ درصد مرگ بیماران مبتلا به بی اشتهائی روانی بر اثر چیست ؟

۱. فشارخون پایین- آمنوریا  
 ۲. غلظت پایین مواد معدنی  
 ۳. گرسنگی- خودکشی  
 ۴. ترک برداشتن پوست- آمنوریا

۲۷- توهم های هیپناگوژیک و هیپنوپامیبیک در کدامیک از نوع اختلال خواب شایع است ؟

۱. پر خوابی اولیه  
 ۲. نارکولپسی  
 ۳. کابوس  
 ۴. بی خوابی اولیه

۲۸- به اختلالی که در آن فرد در ثلث اول شب در حالت خواب عمیق باشد و ناگهان از خواب بیدار شود و با تجربه ترس، داد و فریاد یا گریه همراه است، چه می گویند؟

۱. اختلال کابوس  
 ۲. خواب گردی  
 ۳. آپنه  
 ۴. وحشت شبانه

۲۹- کمبود انتقال دهنده عصبی هیپوکرتین در ابتلا به کدام اختلال خواب موثر است ؟

۱. خوابگردی  
 ۲. نارکولپسی  
 ۳. کابوس  
 ۴. وحشت شبانه

۳۰- مدت زمان لازم برای تشخیص بی خوابی اولیه چقدر می باشد؟

۱. ۱ هفته  
 ۲. ۱۰ روز  
 ۳. ۱۰ ماه  
 ۴. ۱ ماه

۳۱- اختلال نعوظی در کدام طبقه بندی سنی بیشتر شیوع دارد ؟

۱. ۱۸-۲۹  
 ۲. ۵۰-۵۹  
 ۳. ۴۰-۴۹  
 ۴. ۳۰-۳۹

۳۲- براساس پارادیم روان تحلیل گری، اگر مادر صمیمی و حمایت گر و پدر سرد و تهدیدکننده باشد، احتمالاً فرزند مذکر دچار چه اختلالی خواهد شد؟

۱. یادگارخواهی جنسی  
 ۲. میدل پوشی  
 ۳. پارافیلی NOS  
 ۴. اختلال ارگاسمی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

۳۳- مهمترین نظریه پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام نظریه است؟

۱. روان تحلیل گری  
۲. شناختی  
۳. زیستی  
۴. شرطی شدن در مراحل اولیه زندگی

۳۴- بر اساس DSM-IV اختلال در کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به آلزایمر شامل کدام مورد می شود؟

۱. فقدان حافظه و ناتوانی تشخیصی  
۲. مشکل در برنامه ریزی، انتزاع و سازماندهی  
۳. آشفتگی زبانی  
۴. آسیب در انجام اعمال هدفمند

۳۵- کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیر با بیماری آلزایمر رابطه ندارد؟

۱. دوپامین  
۲. استیل کولین  
۳. نورآدرنالین  
۴. سروتونین

۳۶- تمایلات، رفتارها و تخیلات جنسی شدید و تکراری در واکنش به موقعیات ناپسند جامعه چه نامیده می شوند؟

۱. دیس سومنیاها  
۲. پارافیلیاها  
۳. آگنوزیاها  
۴. دمانس جنسی

۳۷- وجود کدام اختلال در بیماران مبتلا به MS موجب پیشرفت سریع بیماری، ناتوانی شدید و مرگ می شود؟

۱. استرس  
۲. خستگی  
۳. افسردگی  
۴. خودکشی

۳۸- فقدان سلول های رنگدانه ای در جسم سیاه و هسته های رنگی دیگر مغز منجر به شکل گیری چه اختلالی می شود؟

۱. صرع  
۲. پارکینسون  
۳. MS  
۴. آلزایمر

۳۹- در بیماری صرع، حالات روان شناختی خشم و پارانوئیا به کدام مورد زیر مربوط می شود؟

۱. لوب گیجگاهی راست  
۲. لوب آهیانه ای  
۳. لوب گیجگاهی چپ  
۴. لوب پس سری

۴۰- مهارت IDEAL که توسط برانسفورد و استاین ارائه گردید، به چه موضوعی مربوط است؟

۱. حل مساله  
۲. مشکلات حافظه  
۳. تصمیم گیری  
۴. درمان افسردگی

92-93-1

1217061

93-1

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحيح	وضعييت كليد	
1		X		ج		عادي	1
2			X	د		عادي	2
3	X			الف		عادي	3
4	X			ج		عادي	4
5		X		د		عادي	5
6			X	ب.ف.		عادي	6
7		X		الف		عادي	7
8	X			الف		عادي	8
9	X			ج		عادي	9
10	X			ب.ف.		عادي	10
11			X	د		عادي	11
12		X		د		عادي	12
13		X		ج		عادي	13
14		X		ب.ف.		عادي	14
15		X		ب.ف.		عادي	15
16		X		ب.ف.		عادي	16
17		X		ج		عادي	17
18	X			الف		عادي	18
19			X	ج		عادي	19
20		X		د		عادي	20
21	X			ج		عادي	21
22	X			الف		عادي	22
23		X		ب.ف.		عادي	23
24		X		ب.ف.		عادي	24
25		X		د		عادي	25
26		X		ج		عادي	26
27		X		ب.ف.		عادي	27
28	X			د		عادي	28
29	X			ب.ف.		عادي	29
30			X	د		عادي	30
31		X		ب.ف.		عادي	31
32		X		ب.ف.		عادي	32
33			X	د		عادي	33
34		X		ب.ف.		عادي	34
35		X		الف		عادي	35
36		X		ب.ف.		عادي	36
37		X		ج		عادي	37
38		X		ب.ف.		عادي	38
39		X		ج		عادي	39
40	X			الف		عادي	40



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
سری سوال: یک ۱  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

۱- اختلال ادواری خوبی چیست؟

۱. حالت خفیف اختلال افسردگی است.
۲. یک حالت فصلی است و فقط در زمستان رخ می دهد.
۳. حالت خفیف تر اختلال افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی است.
۴. نشانه اصلی آن پر نیرویی افراطی است.

۲- پایان یک رابطه محبت آمیز منجر به ..... می شود.

۱. اختلال افسردگی اساسی
۲. واکنش سوگ
۳. افسردگی فصلی
۴. افسردگی بهنجار

۳- طبق DSM، حداقل چند مورد و چه مدتی باید علائم وجود داشته باشد تا بتوان تشخیص اختلال افسردگی را بر فرد گذاشت؟

۱. ۹ مورد- دو هفته
۲. ۹ مورد- یک ماه
۳. ۵ مورد- دو هفته
۴. ۵ مورد- یک ماه

۴- کدامیک از موارد زیر جزء نشانه های انگیزشی افسردگی محسوب نمی گردد؟

۱. فلج ارادی
۲. کندی گفتار
۳. افکار خودکشی
۴. نگرانی مفرط در مورد سلامتی

۵- افسردگی مضاعف ترکیبی از..... است.

۱. افسرده خوبی و افسردگی فصلی
۲. افسردگی خوبی و افسردگی اساسی
۳. افسردگی درون زاد و افسردگی برون زاد
۴. افسردگی یک قطبی و افسردگی فصلی

۶- چه چیزی باعث تمایز افسردگی درون زاد از افسردگی برون زاد شده است؟

۱. مدت زمان بروز علائم
۲. نوع علائم
۳. علل ایجاد کننده اختلال
۴. شدت علائم

۷- کدامیک از اسنادهای زیر مانع افسردگی می شود؟

۱. اسناد درونی
۲. اسناد پایدار
۳. اسناد بیرونی
۴. اسناد کلی

۸- فرد افسرده ای که اعتقاد دارد بدشانس است چون همیشه با شکست مواجه می شود دارای چه خطای منطقی است؟

۱. استنباط دلخواه
۲. انتزاع گزینشی
۳. تعمیم مفرط
۴. شخصی سازی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

- ۹- کدامیک از موارد زیر نمی تواند جز علل ایجاد SAD مطرح گردد؟
۱. هورمون ملاتونین ۰۲. هورمون سرتونین ۰۳. عوامل شناختی ۰۴. عوامل ژنتیک
- ۱۰- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های شناختی دوره های شیدایی نمی باشد؟
۱. پرش افکار ۰۲. ناتوانی در اخذ تصمیم ۰۳. رفتار تکانشی ۰۴. هدیان بزرگ منشی
- ۱۱- کدامیک از هورمون های زیر باعث مانیای می شود؟
۱. سرتونین بالا ۰۲. نوراپی نفرین پایین ۰۳. سرتونین پایین با نوراپی نفرین پایین ۰۴. سرتونین پایین با نوراپی نفرین بالا
- ۱۲- کدام نوع از انواع اسکیزوفرنیا به هبفرنیا معروف است؟
۱. پارانوئید ۰۲. آشفته ۰۳. کاتاتونیک ۰۴. باقیمانده
- ۱۳- کدام یک از موارد زیر با پیش آگهی ضعیف اسکیزوفرن در ارتباط نیست؟
۱. مونث بودن ۰۲. هوش پایین ۰۳. شروع زودرس ۰۴. طبقه اجتماعی پایین
- ۱۴- کدامیک از عبارات های زیر صحیح نمی باشد؟
۱. کاهش جریان خون ناحیه ای مغز در کرتکس پره فرونتال چپ باعث فقر روانی- حرکتی می شود.  
 ۲. کاهش جریان خون ناحیه ای مغز در کرتکس پره فرونتال میانی راست باعث سازمان نایافتگی می شود.  
 ۳. افزایش جریان خون ناحیه ای مغز در بروکا باعث تحریف واقعیت می شود.  
 ۴. افزایش جریان خون ناحیه ای مغز در ورنیکه باعث توهم شنوایی می شود.
- ۱۵- چرا کودکان متولد شده در ماه های زمستان نسبت به کودکان متولد شده در تابستان بیشتر در معرض خطر ابتلا به اسکیزوفرنیا هستند؟
۱. افزایش دوپامین ۰۲. صدمات مغزی هنگام زایمان ۰۳. عفونت ویروسی ۰۴. افزایش آمقمامین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

۱۶- طبق نظریه دوسوکور:

۱. استرس بالا مربوط به پایگاه اجتماعی- اقتصادی برانگیزاننده شروع اسکیزوفرن در افراد آسیب پذیر است.
۲. اسکیزوفرنیا پیامد پرورش بوسیله مادری است که به نظر فداکار می رسد ولی در واقع خود محور و مستبد است.
۳. شیوه های برخورد متضاد والدین با فرزندان باعث سردرگمی و ایجاد استرس در فرزندان شده که منجر به بروز علائم اسکیزوفرن می شود.
۴. هیچکدام

۱۷- طبق مدل شناختی همزلی:

۱. ضعیف شدن اثر زمینه ادراکی قبلاً ذخیره شده از محرک، در ظهور علائم سایکوز نقش دارند.
۲. نیمکره راست مغز اسکیزوفرن ها فعالتر از نیمکره چپ آنهاست.
۳. اسکیزوفرن ها با محیط فیزیکی خود درگیری فوری و مطلق دارند.
۴. سیستم پیشانی آسیب دیده یک جنبه اصلی اسکیزوفرنی است.

۱۸- مدیریت استرس جزء کدام دسته از درمان های اسکیزوفرنیا قرار دارد؟

۱. درمان روان تحلیل گرایانه
۲. درمان شناختی
۳. درمان شناختی رفتاری
۴. درمان رفتاری

۱۹- اختلال شخصیت اسکیزوئید جزء کدام دسته از اختلالات شخصیت قرار می گیرد؟

۱. هیجانی
۲. نامتعارف
۳. مضطرب
۴. ترسو

۲۰- کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟

۱. تشخیص اختلال شخصیت از دوره نوجوانی یا کودکی می باشد.
۲. اختلال شخصیت خود شیفته و مرزی بیشتر در مردان شایع است.
۳. سطح شیوع شخصیت ضد اجتماعی با افزایش سن، زیاد می شود.
۴. طبق مدل شناختی، اختلالات شخصیت از یک مثلث شناختی مربوط به خویشتن، دیگران و آینده حاصل می گردند.

۲۱- تنهایی مفرط و بی علاقگی نسبت به روابط اجتماعی، علامت بارز کدام اختلال شخصیت است؟

۱. اسکیزوتایپال
۲. اسکیزوئید
۳. دوری گزین
۴. مرزی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

۲۲- مکانیسم دفاعی اصلی شخصیت های نمایشی چیست؟

۱. واپس زدن ۰۲. واکنش معکوس ۰۳. برون سازی ۰۴. دلیل تراشی

۲۳- خود آسیب زنی خصوصیات بارز کدام اختلال شخصیت است؟

۱. اسکیزوتایپال ۰۲. مرزی ۰۳. ضد اجتماعی ۰۴. هر سه مورد

۲۴- بهترین درمان شناختی برای افراد مبتلا به شخصیت مرزی چیست؟

۱. تغییر طرحواره های شناختی ۰۲. آموزش آگاهی هیجانی  
۳. آموزش مهارت های اجتماعی ۰۴. درمان معطوف به خانواده

۲۵- کدام یک از موارد زیر جز شباهت های اختلال بی اشتهایی و پر اشتهایی روانی محسوب نمی گردد؟

۱. هر دو گروه از چاق شدن می ترسند. ۰۲. با احساس اضطراب و افسردگی درگیرند.  
۳. نسبت به جاذبه جنسی بی تفاوتند. ۰۴. توجه زیادی به وزن ظاهری خود دارند.

۲۶- کدام یک از موارد زیر در مورد اختلال بی اشتهایی روانی صدق نمی کند؟

۱. بین زنان طبقه اجتماعی بالاتر شایع است. ۰۲. جرات مندی و عزت نفس بالایی دارند.  
۳. سطح سواد بالایی دارند. ۰۴. اشتغال ذهنی بالایی در مورد خوردن دارند.

۲۷- طبق کدام نظریه بیمار مبتلا به بی اشتهایی فاقد احساس خودمختاری و خود بودن است؟

۱. شناختی ۰۲. رفتاری ۰۳. طرحواره ای ۰۴. روان تحلیلی

۲۸- نظریه نقطه تثبیت به کدام قسمت مغز مربوط می شود؟

۱. هیپوتالاموس ۰۲. هیپوفیز ۰۳. تالاموس ۰۴. آمیگدال

۲۹- شب ادراری در کدام مرحله خواب اتفاق می افتد؟

۱. اول ۰۲. دوم ۰۳. سوم ۰۴. Non REM

۳۰- توهمات پیش از خواب..... نام دارد.

۱. هیپنوبامپیک ۰۲. هیپناگوزیک ۰۳. کاتاپلکسی ۰۴. فلج خواب

۳۱- کدام یک از اختلالات زیر جز پاراسومیناها نمی باشد؟

۱. وحشت شبانه ۰۲. خوابگردی ۰۳. نارکولپسی ۰۴. کابوس

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱

۳۲- اختلال اوج لذت جنسی جزء کدام دسته از اختلالات می باشد؟

۱. اختلال میل جنسی  
۲. اختلال تحریک جنسی  
۳. اختلال اوج لذت جنسی  
۴. اختلال درد جنسی

۳۳- کدام اختلال مختص زنان است؟

۱. مقاربت دردناک  
۲. واژینیسم  
۳. اختلال ارگاسم  
۴. اختلال میل جنسی

۳۴- طبق نظریه روانکاوی کدام اختلال جنسی نشانگر مکانیسم دفاعی برگشت است؟

۱. مبدل پوشی  
۲. تماشاگری  
۳. مالش دوستی  
۴. نمایشگری

۳۵- عدم توانایی تشخیص و شناسایی اشیاء در افراد مبتلا به آلزایمر چه نامیده می شود؟

۱. آگنوزیا  
۲. آپراکسی  
۳. آفازی  
۴. آمنزی

۳۶- مهمترین انتقال دهنده عصبی مرتبط با بیماری الزایمر کدام است؟

۱. سرتونین  
۲. نوراپینفرین  
۳. هیپوکرتین  
۴. استیل کولین

۳۷- تخریب غلاف میلین اطراف نورون های مغزی باعث کدام اختلال می گردد؟

۱. آلزایمر  
۲. مالتیپل اسکلروزیس  
۳. پارکینسون  
۴. صرع

۳۸- معروفترین درمان دارویی پارکینسون چیست؟

۱. ترازودن  
۲. بازدارنده های جذب سرتونین  
۳. ال - دوبا  
۴. فلوکستین

۳۹- حملاتی که در آن هشیاری آسیب می بیند کدام نوع تشنج را مشخص می کند؟

۱. ساده  
۲. پیچیده  
۳. محدود  
۴. کلی

۴۰- ساده ترین شاخص شدت صدمه به سر کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. طول مدت درمان  
۲. شدت آسیب وارده به سر  
۳. استانه تحمل درد  
۴. طول مدت لازم برای پیروی دستورات

نمره نهایی پس از ورود بخش تشریحی، عملی و میان ترم محاسبه و در اطلاعات جامع دانشجو قابل مشاهده است

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱			X	ج		عادی
۲			X	ب		عادی
۳			X	ج		عادی
۴	X			د		عادی
۵		X		ب		عادی
۶		X		ج		عادی
۷			X	ج		عادی
۸			X	ج		عادی
۹			X	ج		عادی
۱۰		X		ب		عادی
۱۱	X			د		عادی
۱۲		X		ب		عادی
۱۳			X	الف		عادی
۱۴			X	د		عادی
۱۵			X	ج		عادی
۱۶	X			ج		عادی
۱۷		X		الف		عادی
۱۸			X	ج		عادی
۱۹	X			ب		عادی
۲۰			X	د		عادی
۲۱		X		ب		عادی
۲۲	X			الف		عادی
۲۳		X		ب		عادی
۲۴		X		ب		عادی
۲۵			X	ج		عادی
۲۶		X		ب		عادی
۲۷			X	د		عادی
۲۸	X			الف		عادی
۲۹			X	ج		عادی
۳۰	X			ب		عادی
۳۱			X	ج		عادی
۳۲			X	ج		عادی
۳۳		X		ب		عادی
۳۴			X	الف		عادی
۳۵		X		الف		عادی
۳۶			X	د		عادی
۳۷		X		ب		عادی
۳۸			X	ج		عادی
۳۹		X		ب		عادی

92-93-2

٤٠				X	د	عادي	٤٠
----	--	--	--	---	---	------	----

pnuExam.com

**92-93-2**

www.pnuexam.com

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی  
روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰، ۱۳۱۷۰۶۱

۱- رایج ترین اختلال روانی کدام است؟

۱. اسکیزوفرنی      ۲. افسردگی      ۳. اختلال شخصیت      ۴. اختلال جسمانی شکل

۲- افسردگی مضاعف به چه معناست؟

۱. مجموع افسردگی اساسی و افسرده خویی  
۲. مجموع افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی  
۳. مجموع افسردگی اساسی و اختلال ادواری خویی  
۴. مجموع افسردگی اساسی و اختلال عاطفی فصلی

۳- کدامیک از موارد زیر از باورهای مطرح شده در مثلث شناختی بگ نیست؟

۱. باور مربوط به خودمان  
۲. باور مربوط به گذشته  
۳. باور مربوط به آینده  
۴. باور مربوط به رخدادها یا افراد دیگر

۴- هورمون ملاتونین در ابتلا به کدام اختلال نقش بیشتری دارد؟

۱. افسردگی اساسی      ۲. اختلال دو قطبی      ۳. اختلال ادواری خویی      ۴. اختلال عاطفی فصلی

۵- گزینه صحیح کدام است؟

۱. در اختلال ادواری خویی فرد نشانه های افسردگی اساسی و مانی را به طور شدید تجربه می کند.  
۲. اختلال ادواری خویی اختلال حاد و دوره ای است.  
۳. افراد مبتلا به اختلال ادواری خویی شدیداً در معرض خطر ابتلا به اختلال دو قطبی کامل قرار دارند.  
۴. اختلال ادواری خویی همان اختلال افسردگی اساسی است.

۶- طبق مدل شناختی، عامل ایجاد کننده افسردگی و مانی چیست؟

۱. اشتغال ذهنی با از دست دادن واقعی و خیالی  
۲. تکانه های نامقبول  
۳. عزت نفس پایین و معیارهای غیر واقع گرایانه  
۴. عدم دریافت تقویت

۷- کدام دارو برای تعدیل نوسانات خلقی اختلال دو قطبی تجویز می شود؟

۱. دسی پرامین      ۲. ایمی پرامین      ۳. فلوکستین      ۴. لیتیموم بی کربنات

۸- صحبت و رفتار آشفته و خلق نامتناسب از مشخصه های اصلی کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

۱. کاتاتونیک      ۲. پارانوئید      ۳. باقیمانده      ۴. هبفرنیا

۹- کدامیک از نشانه های زیر جزء نشانه های منفی اسکیزوفرنی محسوب نمی شود؟

۱. هذیان      ۲. بی احساسی      ۳. فقر گفتار      ۴. انزوای اجتماعی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

- ۱۰- در نیمکره شمالی و جنوبی افزایش اسکیزوفرنی در بین متولدین چه ماه هایی دیده می شود؟
۱. متولدین ماه های آخر زمستان تا اول بهار  
 ۲. متولدین آخر تابستان  
 ۳. متولدین ماه های اول بهار  
 ۴. متولدین اول تابستان
- ۱۱- کدام مشخصه بالینی با پیش آگهی بد اسکیزوفرنی ارتباط دارد؟
۱. شروع زودرس یا تدریجی  
 ۲. جنسیت مونث  
 ۳. نشانه های مثبت  
 ۴. IQ بالا
- ۱۲- ضایعه در کدام نواحی مغزی با احتمال بیشتر ایجاد اسکیزوفرنی پارانوئید رابطه دارد؟
۱. لوب تمپورال نیمکره چپ  
 ۲. لوب تمپورال نیمکره راست  
 ۳. لوب پریتال نیمکره چپ  
 ۴. لوب پریتال نیمکره راست
- ۱۳- کدام مدل معتقد است که مبتلایان به اسکیزوفرنی از راهبردهای مقابله ای ضعیفتری در مواجهه با استرس های زندگی استفاده می کنند؟
۱. مدل ضربه روانی  
 ۲. مدل مقابله ای  
 ۳. مدل شناختی  
 ۴. مدل روانکاوی
- ۱۴- ویژگی بارز دسته سوم اختلالات شخصیتی چیست؟
۱. افسردگی  
 ۲. اضطراب  
 ۳. هیجان  
 ۴. عجیب و غریب بودن
- ۱۵- کدامیک از اختلالات شخصیت در زنان شایع تر است؟
۱. مرزی  
 ۲. ضد اجتماعی  
 ۳. خودشیفته  
 ۴. دوری گزین
- ۱۶- علامت بارز اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست؟
۱. سوء ظن  
 ۲. تنهایی مفرط  
 ۳. ناپهنجاری در تفکر  
 ۴. نقض مقررات
- ۱۷- مکانیسم دفاعی اصلی اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟
۱. واپس زدن  
 ۲. فرافکنی  
 ۳. جداسازی  
 ۴. والایش
- ۱۸- سن لازم برای تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی چند سال است؟
۱. حداقل ۱۵  
 ۲. حداقل ۱۸  
 ۳. حداقل ۲۰  
 ۴. حداقل ۱۳
- ۱۹- مکانیزم دفاعی جداسازی در کدامیک از اختلال زیر بیشتر استفاده می شود؟
۱. خودشیفته  
 ۲. نمایشی  
 ۳. دوری گزین  
 ۴. مرزی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۲۰- در رابطه با اختلال شخصیت وسواسی- اجباری کدام گزینه نادرست است؟

۱. کمال گرایی در این مبتلایان مشاهده می شود.
۲. ویژگی این بیماران به افراد تیپ A شبیه است.
۳. اشتغال ذهنی با نظم از نشانه های این اختلال است.
۴. این بیماران تمایل شدید به محول کردن کارهای خود به دیگران دارند.

۲۱- فردی بدون دلیل از افراد صاحب قدرت انتقاد کرده و آنها را تحقیر می کند ، عبوس و اهل مجادله است و بین مخالفت خصمانه و پشیمانی در نوسان است ، وی احتمالاً به کدام نوع اختلال شخصیت مبتلا است؟

۱. افسرده
۲. منفعل پرخاشگر
۳. وابسته
۴. ضداجتماعی

۲۲- کدام گزینه نادرست است؟

۱. افراد مبتلا به بی اشتهایی روانی عزت نفس و جرات مندی پایینی دارند.
۲. اختلال بی اشتهایی روانی در زنان بی سواد و طبقات اجتماعی پایین تر شایع تر است.
۳. مشغله ذهنی مبتلایان به بی اشتهایی روانی کنترل وزن است.
۴. بی اشتهایی روانی در سنین ۱۴ تا ۱۸ سالگی شایع تر است.

۲۳- کدامیک از موارد زیر در نوع محدود کننده بی اشتهای روانی مشاهده می شود؟

۱. مصرف نابجای ملین ها
۲. مصرف مدرها
۳. تنقیه کردن
۴. مصرف مواد کم کالری

۲۴- بارزترین و فوری ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی اشتهایی روانی چیست؟

۱. غلظت پایین مواد معدنی
۲. ترک برداشتن پوست
۳. آمنوریا
۴. فشار خون پایین

۲۵- طبق ملاک های تشخیصی ، رفتارهای جبرانی افراد مبتلا به پر اشتهایی روانی به طور متوسط چند بار در هفته و به مدت چند ماه باید اتفاق افتد تا قابل تشخیص گذاری شود؟

۱. حداقل ۲ بار در هفته و به مدت ۶ ماه
۲. حداقل ۱ بار در هفته و به مدت ۶ ماه
۳. حداقل ۲ بار در هفته و به مدت ۳ ماه
۴. حداقل ۱ بار در هفته و به مدت ۳ ماه

۲۶- تحریک کدام بخش مغز منجر به ایجاد احساس گرسنگی می شود؟

۱. هیپوفیز پسین
۲. هیپوفیز پیشین
۳. هیپوتالاموس جانبی
۴. هیپوتالاموس شکمی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱، روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

- ۲۷- شب ادراری و راه رفتن در حین خواب در کدامیک از مراحل خواب اتفاق می افتد؟
۱. مرحله اول و دوم خواب non-REM  
 ۲. مرحله سوم و چهارم خواب non-REM  
 ۳. مرحله دوم و سوم خواب non-REM  
 ۴. مرحله خواب REM
- ۲۸- اختلال پر خوابی اولیه بر اساس DSM-۴ باید چه مدت تداوم داشته باشد تا تشخیص گذاشته شود؟
۱. یک ماه  
 ۲. سه ماه  
 ۳. شش ماه  
 ۴. یک سال
- ۲۹- منظور از کاتاپلکسی چیست؟
۱. توهم پیش از خواب  
 ۲. توهم پس از خواب  
 ۳. حملات غیر قابل مقاومت خواب  
 ۴. از بین رفتن ناگهانی قوام عضلانی
- ۳۰- فردی از نگاه کردن به افراد برهنه در حال تعویض لباس بدون آنکه آنها باخبر باشند، لذت می برد وی به کدام اختلال مبتلاست؟
۱. نمایشگری جنسی  
 ۲. تماشاگری جنسی  
 ۳. یادگار خواهی جنسی  
 ۴. یادگار خواهی همراه با مبدل پوشی
- ۳۱- کدامیک از اختلال های زیر جزء پارافیلیاها محسوب نمی شود؟
۱. تمایل جنسی به کودکان  
 ۲. مازوخیسم جنسی  
 ۳. واژینیسم  
 ۴. سادیسم جنسی
- ۳۲- دارو شناخته شده برای اختلال نعوظی کدام است؟
۱. بنزودیازپین ها  
 ۲. ایمی پرامین  
 ۳. زولپیدم  
 ۴. سیلدنافیل
- ۳۳- مهمترین نظریه پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام نظریه است؟
۱. روانکاوی  
 ۲. شرطی شدن  
 ۳. زیست شناسی  
 ۴. شناختی
- ۳۴- درمان اختلال هویت جنسی باید چه مدت قبل از جراحی شروع شود؟
۱. ۲۴ ماه  
 ۲. ۱۲ ماه  
 ۳. ۱ ماه  
 ۴. ۳ ماه
- ۳۵- در بیماران آلزایمری کدام حافظه ابتدا آسیب می بیند؟
۱. حافظه دور  
 ۲. حافظه معنایی  
 ۳. حافظه اخیر  
 ۴. حافظه بلند مدت

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱، روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۳۶- آسیب دیدن توانایی ها برای انجام اعمال (هدفمند) علیرغم سالم بودن کارکردهای حرکتی چه نامیده می شود؟

۱. آمنزی  
 ۲. آپراکسی  
 ۳. آگنوزی  
 ۴. اختلال در کارکردهای اجرایی

۳۷- فردی مبتلا به دمانس برای کارهای معمولی خود نیازمند کمک است و ممکن است رفتارهای مشکل داری نظیر پرخاشگری داشته باشد، وی در کدام سطح دمانس جای می گیرد؟

۱. دمانس مبهم  
 ۲. دمانس خفیف  
 ۳. دمانس متوسط  
 ۴. دمانس شدید

۳۸- مهمترین انتقال دهنده عصبی مرتبط با آلزایمر چیست؟

۱. نورآدرنالین  
 ۲. استیل کولین  
 ۳. دوپامین  
 ۴. سروتونین

۳۹- فقر و کندی حرکات ارادی، لرزش مداوم، قامت خمیده، خشکی و کندی در سرعت راه رفتن، از ویژگی های اصلی کدام اختلال است؟

۱. آلزایمر  
 ۲. صرع  
 ۳. پارکینسون  
 ۴. MS

۴۰- شایع ترین اختلال روانشناختی در بیماران صرعی کدام است؟

۱. اختلال افسردگی  
 ۲. اختلال اضطراب  
 ۳. اختلال شخصیت  
 ۴. اختلال اسکیزوفرنی

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
١	X				ب	عادي
٢			X		الف	عادي
٣		X			ب	عادي
٤				X	د	عادي
٥			X		ج	عادي
٦			X		ج	عادي
٧				X	د	عادي
٨	X				د	عادي
٩		X			الف	عادي
١٠	X				الف	عادي
١١			X		الف	عادي
١٢	X				الف	عادي
١٣		X			ب	عادي
١٤		X			ب	عادي
١٥			X		الف	عادي
١٦		X			ب	عادي
١٧		X			ب	عادي
١٨	X				ب	عادي
١٩				X	د	عادي
٢٠		X			د	عادي
٢١		X			ب	عادي
٢٢		X			ب	عادي
٢٣				X	د	عادي
٢٤			X		ج	عادي
٢٥	X				ج	عادي
٢٦			X		ج	عادي
٢٧		X			ب	عادي
٢٨			X		الف	عادي
٢٩	X				د	عادي
٣٠		X			ب	عادي
٣١			X		ج	عادي
٣٢				X	د	عادي
٣٣		X			ب	عادي
٣٤	X				ب	عادي
٣٥		X			ج	عادي
٣٦			X		ب	عادي
٣٧			X		ج	عادي
٣٨		X			ب	عادي
٣٩			X		ج	عادي
٤٠		X			ج	عادي

93-94-1

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
 سری سوال: یک ۱  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی  
 روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰، ۱۲۱۷۰۶۱ -

- ۱- تمایز اختلال عاطفی فصلی با اختلال افسردگی اساسی در چیست؟
۱. طول مدت اختلال عاطفی فصلی کوتاهتر است.
  ۲. اختلال عاطفی فصلی، یک حالت فصلی است و در زمستان رخ می دهد.
  ۳. طول مدت اختلال افسردگی اساسی کوتاهتر است.
  ۴. تفاوت چندانی ندارد.
- ۲- در کدام یک از انواع افسردگی نشانه ها شدیدتر و میزان بهبودی کمتر است؟
۱. افسردگی درونزاد
  ۲. افسردگی برونزاد
  ۳. افسردگی مضاعف
  ۴. افسردگی اساسی
- ۳- بر طبق طبقه بندی DSM-IV-TR در اختلال دو قطبی نوع II کدام دوره ها (مانی یا افسردگی) مسلطند؟
۱. دوره های افسردگی مسلط هستند.
  ۲. دوره های مانیا شدیدتر است.
  ۳. افراد دوره های متغیری از افسردگی و مانیا را تجربه می کنند.
  ۴. نسبت هر دو برابر است.
- ۴- طبق مدل شناختی، چه عواملی موجب دوره هایی از افسردگی و مانی (اختلال دوقطبی) می شوند؟
۱. عزت نفس و اعتماد به نفس بالا
  ۲. اضطراب بالا و طرحواره
  ۳. توهم ها و هذیان ها
  ۴. معیارهای غیر واقع گرایانه در مورد موفقیت
- ۵- غم ناشی از مرگ عزیزان و پایان یک رابطه محبت آمیز چه نام دارد؟
۱. داغدیدگی
  ۲. افسردگی
  ۳. سوگ
  ۴. موارد الف و ج
- ۶- جمله «همیشه برای من رخ می دهد» مربوط به کدام نوع اسناد است؟
۱. اسناد درونی
  ۲. اسناد کلی
  ۳. اسناد پایدار
  ۴. اسناد کلی و پایدار
- ۷- ناتوانی مربوط به بیماری اسکیزوفرنی بیشتر ناشی از فقدان چه نقص هایی است؟
۱. زیستی
  ۲. شناختی
  ۳. شناختی- رفتاری
  ۴. رفتاری

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۸- به عقیده بلولر اسکیزوفرنیا بیشتر تحت تأثیر چه عواملی به وجود می آید؟

۱. تحت نفوذ پیشرفت های آسیب شناسی بالینی
۲. تحت تأثیر عوامل روانشناختی
۳. بیشتر نشانه های سایکوزی این بیماری مدنظر بود.
۴. به نظر او هذیانها و توهمات، پدیدههای اولیه و اصلی بودند.

۹- ویژگی نوع کاتاتونیک اسکیزوفرنیا در کدام گزینه آمده است؟

۱. آشفتگی های خلقی
۲. آشفتگی های گفتاری
۳. آشفتگی روانی- حرکتی بارز
۴. هذیانهای پارانوئیدی

۱۰- در نیمکره شمالی و جنوبی افزایش بیماری اسکیزوفرنی در بین متولدین چه ماه هایی دیده می شود؟

۱. متولدین ماه های آخر زمستان تا اول بهار
۲. متولدین آخر تابستان
۳. متولدین ماه های اول بهار
۴. متولدین اول تابستان

۱۱- براساس مطالعات تغییرات ساختاری در بخش فرونتال مغز، حجم کوچکتر گيروسی استریت با کدام یک از موارد زیر ارتباط دارد؟

۱. اختلال در تفکر
۲. ناسازگاری اجتماعی
۳. توهمات شنوایی
۴. رفتار آشفته

۱۲- میزان بالایی از اسکیزوفرنیا در بین چه گروه هایی دیده می شود؟

۱. گروههای اجتماعی- اقتصاد بالاتر
۲. در خانواده های سرد و مستبد
۳. طبقات اجتماعی- اقتصادی متوسط
۴. گروههای اجتماعی- اقتصادی پائین تر

۱۳- طبق طبقه بندی DSM-IV-TR، کدام اختلال زیر در دسته سوم (ترسو یا مضطرب) اختلالات شخصیت قرار می گیرد؟

۱. اختلال شخصیت پارانوئید
۲. اختلال شخصیت وابسته
۳. اختلال شخصیت اسکیزوئید
۴. اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

۱۴- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی مرزی محسوب نمی شود؟

۱. احساس خالی بودن
۲. فرار از روابط نزدیک
۳. آشفتگی هویت
۴. خود آسیب زنی عمدی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۱۵- کدام گزینه به نظریه یانگ و لیندمان در مورد طرحواره های مربوط به اختلالات شخصیت مربوط نمی شود؟

۱. حفظ طرحواره      ۲. اجتناب از طرحواره      ۳. جبران طرحواره      ۴. فقدان طرحواره

۱۶- حجم ماده خاکستری پره فرونتال افرادی که به اعمال ضداجتماعی اشتغال داشتند چه تغییری نشان می دهد؟

۱. افزایش می یابد.      ۲. کاهش می یابد.      ۳. تغییری نمی کند.      ۴. رشد نمی کند.

۱۷- از نظر راث و همکاران برای افراد مبتلاء به اختلال شخصیت که سن پایین تر از ۳۰ سال دارند، مهمترین مسئله چه احتمالی است؟

۱. افسردگی      ۲. خودکشی      ۳. خود آسیب زنی      ۴. روان پریشی

۱۸- در اختلالات شخصیت مؤثرترین مداخلات روانشناختی کدامند؟

۱. آنهایی که به خانواده معطوف می شوند.      ۲. رویکرد مبتنی بر همسالان  
۳. مداخلات مبتنی بر همسالان      ۴. آموزش مهارت اجتماعی و حل مسئله

۱۹- اختلال بی اشتهایی و پراشتهایی روانی معمولاً از چه زمانی بروز می کند؟

۱. پس از یک دوره رژیم سخت غذایی در افرادی که از چاق شدن می ترسند.  
۲. بعد از قرار گرفتن در موقعیت اضطراب آور.  
۳. وقتی افراد از لاغری مفرط در عذاب باشند.  
۴. از زمانی که رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

۲۰- بارزترین و فوری ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی اشتهایی روانی چیست؟

۱. زبردن پوست      ۲. آمنوریا      ۳. فشار خون پایین      ۴. خشکی مو

۲۱- مطالعات نشان داده اند که ۷۴ درصد واریانس رفتارهای بی اشتهایی به چه عواملی مربوط می شوند؟

۱. عوامل زیست شناختی      ۲. روانشناختی      ۳. ژنتیکی      ۴. شناختی

۲۲- براساس طرحواره های خویشتن مربوط به وزن، اشخاص چگونه ارزیابی می شوند؟

۱. براساس صلاحیت فردی      ۲. با افکار و احساساتشان  
۳. براساس چاقی یا لاغریشان      ۴. براساس تجارب فردی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۳- در تبیین روان تحلیلی، بیماران مبتلا به بی اشتهایی روانی فاقد کدام یک از موارد زیر می باشند؟

۱. احساس وابستگی به اطرافیان و رابطه به آنها
۲. فاقد احساس نشاط و شادی
۳. خود انضباطی
۴. فاقد احساس خودمختاری و خود بودن

۲۴- بر طبق آمار، نیمی از بیماران که به طور معمول تحت درمان چاقی قرار می گیرند دچار چه عارضه هایی هستند؟

۱. مصرف مواد
۲. افسردگی و اضطراب خفیف
۳. وسواس- جبری
۴. اضطراب بالا

۲۵- کدام نوع خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟

۱. مرحله دوم خواب non-REM
۲. non-REM
۳. REM
۴. مرحله چهارم non-REM

۲۶- کدام یک از روش های زیر، شیوه مؤثری در درمان بی خوابی اولیه است؟

۱. درمان آرمیدگی
۲. شرطی شدن مجدد
۳. درمان مجدد محدودسازی خواب
۴. دارو درمانی

۲۷- پر خوابی اولیه چه زمانی به عنوان یک اختلال مطرح می شود؟

۱. وقتی که بروز خانوادگی داشته باشد.
۲. زمانی که علت دیگری برای پر خوابی فرد نمیتوان یافت.
۳. زمانی که فرد شکایت عمدهای از خواب آلودگی به مدت ۲ ماه دارد.
۴. زمانی که فرد مشکلاتی در زمینه های مختلف زندگی پیدا نمی کند.

۲۸- ناركولپسی حداقل در چه مدتی قابل تشخیص است؟

۱. ۱ ماه
۲. ۳ ماه
۳. ۲ هفته
۴. ۶ هفته

۲۹- تفاوت اختلال وحشت شبانه و خواب گردی در کدام گزینه زیر آمده است؟

۱. در وحشت شبانه فرد به طور معمولی بیدار می شود، رویای دیده شده را به یاد نمی آورد.
۲. در اختلال خوابگردی فرد با هشیاری به یکسری اعمال پیچیده دست میزند.
۳. در اختلال خوابگردی، فرد رویای زیادی را تجربه می کند.
۴. در وحشت شبانه فرد رویای دیده شده را به خاطر می آورد.

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱، روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

- ۳۰- برای درمان وحشت شبانه و خوابگردی چه عواملی دارای اهمیت است؟
۱. بررسی سوابق خوابگردی
  ۲. بررسی طول مدت ابتلاء به این اختلال ها
  ۳. بررسی وضعیت زندگی و خانوادگی
  ۴. بررسی تاریخچه بیماری
- ۳۱- اولین اختلال در طبقه اختلالات مربوط به میل جنسی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. اختلال میل جنسی کم کار
  ۲. انزوال زودرس
  ۳. واژینیسم
  ۴. اختلال بیزاری جنسی
- ۳۲- زمانی که فرد با رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رسان نسبت به موضوع جنسی خود، به برانگیختگی جنسی دست می یابد کدام اختلال مطرح است؟
۱. نمایشگری جنسی
  ۲. مازوخیسم
  ۳. سادیسم جنسی
  ۴. تمایل جنسی نسبت به کودکان
- ۳۳- در تبیین شناختی اختلال نعوظی، از نظر بن کرافت چه عاملی عملکرد جنسی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد؟
۱. اضطراب
  ۲. ترس
  ۳. تمایلات همجنس گرایانه
  ۴. تمایلات پرخاشگرانه
- ۳۴- اختلال هویت جنسی معمولاً از چه سنی قابل ردیابی هستند؟
۱. قبل از ۶ سالگی
  ۲. ۴ سالگی
  ۳. قبل از ۳ سالگی
  ۴. ۱۲ سالگی
- ۳۵- نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به GID چه اشتغال ذهنی در مورد جنسیت شان دارند؟
۱. از اندامهای جنسی، جنس مقابل متنفرند.
  ۲. معتقدند که با یک جنسیت غلط به دنیا آمده اند.
  ۳. احساس جذابیت نمی کنند.
  ۴. به تغییر جنسیت عمل جراحی فکر می کنند.
- ۳۶- اختلال عصب شناختی نتیجه آسیب به چه بخشهایی از بدن می باشد؟
۱. دستگاه عصبی خودمختار
  ۲. دستگاه عصبی مرکزی
  ۳. سلولهای عصبی
  ۴. بخش پیکری
- ۳۷- در فرآیندهای عصب شناختی بیماری آلزایمر، در بخش ساختاری، لکه های آمیلوئید، چه عاملی را سبب می شوند؟
۱. باعث مرگ نرونی می شوند.
  ۲. باعث ایجاد کانالهایی در غشاء می شوند.
  ۳. باعث آسیب پروتئین آمیلوئید می شوند.
  ۴. موجب خروج کلسیم از نرون می شوند.



تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱، روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۳۸- مشخصه شایع علائم جسمی بیماری MS کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- ۱. از بین رفتن کارکرد پاها
- ۲. آسیب شناختی
- ۳. فقدان کنترل مثانه
- ۴. انقباض عضلانی به ویژه در اندامهای بالاتنه

۳۹- در سبب شناسی بیماری پارکینسون، علت بروز بیماری کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- ۱. شخصیت غیرقابل انعطاف
- ۲. آشفتگی هیجانی
- ۳. ضربه های روانی
- ۴. فقدان سلولهای رنگدانه های در جسم سیاه

۴۰- شایعترین اختلال روانشناختی در بیماران صرعی چیست؟

- ۱. اختلالات خلقی
- ۲. اختلالات شخصیتی
- ۳. افسردگی
- ۴. اضطراب فراگیر

93-94-2

1217061 94-2

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
1		X			ب	عادي
2			X		ج	عادي
3			X		الف	عادي
4				X	د	عادي
5				X	د	عادي
6			X		ج	عادي
7			X		ب	عادي
8				X	ب	عادي
9			X		ج	عادي
10	X				الف	عادي
11		X			ب	عادي
12			X		د	عادي
13	X				ب	عادي
14			X		ب	عادي
15				X	د	عادي
16	X				ب	عادي
17		X			ب	عادي
18				X	الف	عادي
19	X				الف	عادي
20		X			ب	عادي
21			X		ج	عادي
22		X			ج	عادي
23	X				د	عادي
24	X				ب	عادي
25			X		ج	عادي
26		X			ب	عادي
27				X	د	عادي
28	X				ب	عادي
29	X				الف	عادي
30			X		ج	عادي
31	X				الف	عادي
32			X		ج	عادي
33	X				الف	عادي
34				X	ج	عادي
35		X			ب	عادي
36			X		ب	عادي
37			X		ج	عادي
38				X	د	عادي
39				X	د	عادي
40		X			ب	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
 سری سوال: یک ۱  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی  
 روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰، ۱۳۱۷۰۶۱ -

- ۱- حالت خفیف تر اختلال دو قطبی چه نام دارد؟  
 ۱. ادواری خوبی ۲. افسردگی فصلی ۳. افسرده خوبی ۴. هیچکدام
- ۲- افسردگی درون زاد را ..... می گویند.  
 ۱. افسردگی مضاعف ۲. افسردگی بدون مالیخولیا  
 ۳. افسردگی همراه با مالیخولیا ۴. افسردگی اساسی
- ۳- سطوح پایین کدام انتقال دهنده موجب افسردگی می شود؟  
 ۱. دوپامین ۲. استیل کولین ۳. سروتونین ۴. نور اپی نفرین
- ۴- از نظر لوینسون تبیین نظریه های رفتاری در مورد علت افسردگی چیست؟  
 ۱. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت ۲. وابستگی به دیگران  
 ۳. تثبیت در غم و اندوه ۴. عزت نفس پایین
- ۵- کدام گزینه مربوط به مثلث شناختی نیست؟  
 ۱. باورهای مربوط به آینده ۲. باورهای مربوط به رخدادها یا افراد  
 ۳. باورهای مربوط به خود ۴. باورهای مربوط به گذشته
- ۶- نتیجه گیری های منفی کلی درباره توانایی یا عملکرد بر حسب یک مورد جزء کدام پنج خطای منطقی فرد افسرده است؟  
 ۱. انتزاع گزینشی ۲. تعمیم مفرط ۳. استنباط دلخواه ۴. شخصی سازی
- ۷- کدام یک از داروها عمر انتقال دهنده های عصبی را در افسردگی افزایش می دهد؟  
 ۱. TCA ۲. SSRI ۳. Orap ۴. MAOI
- ۸- میزان سروتونین پایین همراه با نور اپی نفرین بالا منجر به بروز کدام اختلال می گردد؟  
 ۱. مانیا ۲. افسردگی ۳. اسکیزوفرنی ۴. سایکوز
- ۹- شدیدترین اختلال روانی کدام است؟  
 ۱. افسردگی ۲. اسکیزوفرنی ۳. دو قطبی ۴. مانیا
- ۱۰- هیفرنیا کدام نوع اسکیزوفرنی است؟  
 ۱. کاتاتونیک ۲. باقی مانده ۳. آشفته ۴. پارانوئید

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

- ۱۱- اسکیزوفرنی مزمن چه نشانه هایی دارد؟
۱. شروع ناگهانی ۲. احتمال بهبودی زیاد ۳. پیش آگهی خوب ۴. پیش آگهی بد
- ۱۲- مشهورترین نشانه اسکیزوفرنی چیست؟
۱. آشفتگی در فرایندهای تفکر ۲. مکالمات فاقد هماهنگی ۳. هذیان بزرگ منشی ۴. هذیان کنترل
- ۱۳- مصرف کدام ماده مخدر منجر به بروز بعدی اسکیزوفرنی می شود؟
۱. تریاک ۲. کوکائین ۳. شیشه ۴. هروئین
- ۱۴- کدام مطالعه تصویر برداری نخستین و قانع کننده ترین داده ها را از این که اسکیزوفرنی یک بیماری مغزی واقعی است به دست داده است؟
۱. FMRI ۲. SPET ۳. rCBF ۴. CT
- ۱۵- ضایعات در کدام قسمت مغز باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شنوایی شدید می شود؟
۱. لوب پیش پیشانی ۲. لوب گیجگاهی ۳. لوب تمپورال ۴. لوب پس سری
- ۱۶- حجم کوچکتر گیروس استریت در اسکیزوفرنها با کدام یک از ناسازگاری های زیر ارتباط دارد؟
۱. رفتاری ۲. اجتماعی ۳. تحصیلی ۴. جنسی
- ۱۷- مصرف کدام ماده مخدر باعث بالا رفتن دوپامین می شود؟
۱. شیشه ۲. کراک ۳. تریاک ۴. حشیش
- ۱۸- کدام یک از داروهای زیر فقط بر روی نشانه های مثبت اسکیزوفرنی اثر می گذارد؟
۱. کلوزاپین- هالوپریدول ۲. کلرپرومازین- هالوپریدول ۳. دیازپام- کلر پرومازین ۴. کلوزاپین- کلرپرومازین
- ۱۹- روابط شخصی بی ثبات و شدید ویژگی کدام اختلال شخصیت می باشد؟
۱. وسواسی- جبری ۲. خودشیفته ۳. مرزی ۴. پارانوئید

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

- ۲۰- عمل در جهت عکس محتوای طرحواره جزء کدام یک از سه فرایند طرحواره است؟  
 ۱. جبران طرحواره ۲. حفظ طرحواره ۳. اجتناب از طرحواره ۴. هیچکدام
- ۲۱- کدام اختلال شخصیت با بالا رفتن سن و از دست دادن مقام دچار افسردگی می شود؟  
 ۱. نمایشی ۲. خودشیفته ۳. مرزی ۴. ضد اجتماعی
- ۲۲- سطح پایین کدام انتقال دهنده عصبی و کاهش حجم ماده کدام قسمت مغز در ایجاد شخصیت ضد اجتماعی نقش دارد؟  
 ۱. دوپامین - پیش پیشانی ۲. سروتونین - پس سری  
 ۳. دوپامین - پس سری ۴. سروتونین - پیش پیشانی
- ۲۳- شروع نوع بدخیم بیماری MS معمولاً در چه سنینی رخ می دهد؟  
 ۱. قبل از ۱۵ سالگی ۲. بعد از ۴۰ سالگی ۳. ۳۵ سالگی ۴. بعد از ۲۰ سالگی
- ۲۴- رایج ترین نشانه های صدمات بسته چیست؟  
 ۱. آسیب های حافظه ای ۲. آسیب به مهارتهای زبانی  
 ۳. آسیب های شناختی ۴. نقص های شناختی و عصب - رفتاری
- ۲۵- ویژگی زیر مربوط به کدام اختلال می باشد؟ (دوری گزین و علاقه مند شدید به ایجاد رابطه با دیگران)  
 ۱. اسکیزوتیپید ۲. اسکیزوتایپال ۳. اجتنابی ۴. پارانوئید
- ۲۶- شایع ترین اختلال شخصیت کدام است؟  
 ۱. مرزی ۲. هیستریک ۳. وابسته ۴. اجتنابی
- ۲۷- فوری ترین پیامد بی اشتهایی روانی چیست؟  
 ۱. قطع دوره های ماهیانه ۲. لاغری شدید ۳. ضعف جسمانی ۴. بدشکلی بدن
- ۲۸- ۸۰ الی ۹۰ درصد افراد مبتلا به پراشتهایی روانی بعد از خوردن غذا جهت کنترل وزنشان چه کاری را انجام می دهند؟  
 ۱. استفاده از ملین ها ۲. استفراغ عمدی ۳. ورزشهای شدید ۴. همه موارد
- ۲۹- تنقیه کردن و روزه داری به ترتیب جزء کدام یک از انواع پراشتهایی هستند؟  
 ۱. غیر تخلیه ای - تخلیه ای ۲. تخلیه ای - تخلیه ای  
 ۳. تخلیه ای - غیر تخلیه ای ۴. غیر تخلیه ای - غیر تخلیه ای

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۰- مهمترین پیامد رفتارهای جبرانی پراشتهایی روانی چیست؟

۱. عدم تعادل الکترولیت

۲. مشکلات گوارشی

۳. آسیب شکمی

۴. آسیب به پشت دندانها

۳۱- سطح پایین کدام انتقال دهنده عصبی منجر به جستجوی کربوهیدراتها و دوره های پرخوری می شود؟

۱. دوپامین

۲. نور اپی نفرین

۳. استیل کولین

۴. سروتونین

۳۲- از نظر فروید تثبیت در کدام مرحله رشد موجب بی اشتهایی روانی می شود؟

۱. جنسی

۲. تناسلی

۳. دهانی

۴. مقعدی

۳۳- کودکانی که دچار شب ادراری و یا راه رفتن در خواب هستند معمولا در کدام مرحله از خواب می باشند؟

۱. سوم و دوم

۲. اول و چهارم

۳. سوم و چهارم

۴. اول و دوم

۳۴- کدام اختلال خواب موجب مشکل در کارکردهای اجتماعی، شغلی فرد می شود؟

۱. حمله خواب

۲. پر خوابی اولیه

۳. بی خوابی اولیه

۴. اختلال خواب دوره شبانه روزی

۳۵- مهمترین درمان ناركولپسی چیست؟

۱. شوک درمانی

۲. آرمیدگی

۳. تمرکز

۴. دارو درمانی

۳۶- کدام دارو برای درمان کابوس در خواب تجویز می شود؟

۱. سه حلقه ای

۲. زولپیدم

۳. زالپلون

۴. بنزودیازپین

۳۷- نمایش آلت به فرد غریبه ای که انتظار این کار را از او ندارد جزء کدام نوع پارافیلی ها است؟

۱. یادگارخواهی جنسی

۲. سادیسم جنسی

۳. نمایشگری جنسی

۴. تماشاگری جنسی

۳۸- مهمترین دارو برای درمان اختلال نعوظی چیست؟

۱. فیناستراید

۲. دیازپام

۳. زالپلون

۴. ویاگرا

۳۹- یبزاری درمانی در مبدل پوشی معمولا چگونه انجام می شود؟

۱. شوک درمانی

۲. دارو درمانی

۳. گفتار درمانی

۴. همه موارد





سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۴۰- هویت جنسی زنانه در مردان طبق تبیین رویداد تحلیلی ناشی از چیست؟

۱. واپستگی به مادر

۲. بیزاری از پدر

۳. اضطراب جدایی مفرط اولیه

۴. افسردگی

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
عادی	الف				X	1
عادی	ج		X			2
عادی	ج		X			3
عادی	الف	X				4
عادی	د	X				5
عادی	ب			X		6
عادی	د	X				7
عادی	الف		X			8
عادی	ب			X		9
عادی	ج		X			10
عادی	د		X			11
عادی	الف				X	12
عادی	ب			X		13
عادی	د		X			14
عادی	ج			X		15
عادی	ب			X		16
عادی	د	X				17
عادی	ب			X		18
عادی	ج	X				19
عادی	الف			X		20
عادی	ب			X		21
عادی	د		X			22
عادی	ب				X	23
عادی	د	X				24
عادی	ج		X			25
عادی	ج			X		26
عادی	الف				X	27
عادی	ب	X				28
عادی	ج			X		29
عادی	الف			X		30
عادی	د		X			31
عادی	ج		X			32
عادی	ج		X			33
عادی	ج			X		34
عادی	د	X				35
عادی	الف				X	36
عادی	ج		X			37
عادی	د	X				38
عادی	الف	X				39
عادی	ج	X				40

pasokh 95-1

سری سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰ - ۱۳۱۷۰۶۱

۱- بر طبق نتایج پژوهش های برونیس و ویچن ۱۹۹۴ چند درصد افرادی که هیچ اختلال روانی نداشتند تفکراتی در مورد خودکشی نشان دادند؟

۰.۱ ۲ درصد      ۰.۲ ۸ درصد      ۰.۳ ۶۵ درصد      ۰.۴ ۶۹ درصد

۲- کدام دانشمند، احساس گناه، نشانه های هذیانی افسرده وار و ناآرامی درونی و بی قراری را از جمله ویژگی های روانشناختی افرادی می داند که تلاش هایی برای خودکشی دارند؟

۰.۱ ابرامسون      ۰.۲ بک      ۰.۳ دورکیم      ۰.۴ ولفر سدورف

۳- در اواسط دهه ۱۹۸۰ کدام اختلال بوسیله روزنتال و همکارانش مطرح گردید؟

۰.۱ اختلال دو قطبی      ۰.۲ اختلال عاطفی فصلی

۰.۳ اختلال افسردگی اساسی      ۰.۴ اختلال ادواری خویی

۴- سطح پایین ملاتونین باعث ایجاد کدام حالت در فرد می شود؟

۰.۱ خلق پایین      ۰.۲ هیپومانیا      ۰.۳ خلق بالا و سرخوشی      ۰.۴ غمگینی مفرط

۵- کدام دسته از اختلالات تاریخچه پژوهشی کوتاهی را به خود اختصاص داده است؟

۰.۱ عاطفی فصلی      ۰.۲ افسرده خویی      ۰.۳ دو قطبی نوع I      ۰.۴ مانیک دپرسیو

۶- فرد مبتلا به کدام اختلال ممکن است بوسیله اعمال دیگران ناکامی را تجربه کند؟

۰.۱ مانیک      ۰.۲ افسردگی اساسی      ۰.۳ اسکیزوفرنی      ۰.۴ افسردگی فصلی

۷- کدامیک از اختلالات زیر اختلال مزمنی است که حداقل ۲ سال ادامه دارد و فرد مبتلا، هیپومانیا را به صورت دوره ای تجربه می کند؟

۰.۱ دو قطبی      ۰.۲ عاطفی فصلی      ۰.۳ ادواری خویی      ۰.۴ افسردگی

۸- لیتیوم برای درمان کدام اختلال موثر می باشد؟

۰.۱ استرس      ۰.۲ اضطراب      ۰.۳ افسردگی      ۰.۴ دو قطبی

۹- کدام نوع اسکیزوفرنی هم اکنون در کشورهای صنعتی به ندرت دیده می شود؟

۰.۱ آشفته      ۰.۲ پارانویید      ۰.۳ باقی مانده      ۰.۴ کاتاتونیک

۱۰- فقر گفتار، بی حالتی عاطفی، فقدان لذت، انزوا از ویژگی کدام دسته از اسکیزوفرنی می باشد؟

۰.۱ پارانویید      ۰.۲ آشفته      ۰.۳ مثبت      ۰.۴ منفی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱، روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

- ۱۱- بر اساس مطالعات لیدل و همکاران کاهش RCBF در کرتکس پره فرونتال میانی و چپ منجر به چه عاملی می شود؟
۱. فقر روانی-حرکتی  
۲. افزایش مسائل مربوط به حرکت  
۳. کاهش سازمان نیافتگی  
۴. افزایش هیجانان
- ۱۲- بر چه اساسی می توان ناهماهنگی دو قلوهای یک تخمکی را درابتلا به اسکیزوفرنی تمیز داد؟
۱. بررسی بطن ها و کاهش حجم کرتکس تمپورال  
۲. بررسی لوب پاریتال تحتانی چپ  
۳. کاهش فعالیت آلفا در نیمکره چپ  
۴. افزایش حجم کرتکس تمپورال
- ۱۳- بر طبق پژوهش بارچ و همکاران (۲۰۰۲) کدام ناحیه در بیماران اسکیزوفرنی در دو حافظه کاری و بلند مدت کاهش فعالیت را نشان می دهد؟
۱. کرتکس سینگولار قدامی دو طرف  
۲. لوب تمپورال میانی  
۳. کرتکس پره فرونتال دورسولا ترال راست  
۴. کرتکس پره فرونتال میانی و چپ
- ۱۴- ممانعت از جذب کدام دسته از داروها در مکان گیرنده پس سیناپسی از انتقال دوپامین جلوگیری می کند؟
۱. ترازادون  
۲. فنوباربیتال  
۳. سرتالین  
۴. فنوتیازین
- ۱۵- بررسی های پس از مرگ بیماران اسکیزوفرنیک کاهش در تراکم نورون های کدام قسمت را نشان می دهند؟
۱. هیپوکامپ  
۲. تالاموس  
۳. پیشانی  
۴. هیپوتالاموس
- ۱۶- چه کسی معتقد بود که هذیان ها، اعمال گفتاری خالی هستند که به دنیا و خویشان معطوف نیستند و آنها نماد چیزی نیستند؟
۱. بنتال  
۲. همزلی  
۳. بریوس  
۴. آدل دیاموند
- ۱۷- کدام دارو اثر مستقیمی بر روی توهمات و هذیان ها دارد؟
۱. کلوزاپین  
۲. ترازادون  
۳. فلووکسامین  
۴. پروکستین
- ۱۸- یبوست، آشفستگی های بینایی و کاهش یا افزایش وزن از عوارض کدام دارو محسوب می شود؟
۱. دسی پرامین  
۲. پروزاک  
۳. کلوزاپین  
۴. کلرپرومازین
- ۱۹- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال محسوب می شود؟
۱. سوء ظن  
۲. فاقد انعطاف پذیری  
۳. حساسیت  
۴. از نظر هیجان سرد

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۰- کدام گزینه جز ویژگی های شخصیتی اختلال اسکیزوتیید محسوب می شود؟

۱. خسته کردن دیگران  
 ۲. توانایی در ابراز مستقیم خشم  
 ۳. ناپهنجاری در تفکر  
 ۴. فقدان اعتماد به نفس

۲۱- شیوع کدام دسته از اختلالات شخصیتی ۳۰ درصد جمعیت عمومی را شامل می شود؟

۱. دوری گزین  
 ۲. مرزی  
 ۳. خودشیفته  
 ۴. اسکیزوتایپال

۲۲- در کدام دسته از اختلالات شخصیتی، تحت تاثیر استرس، واقعیت سنجی فرد به آسانی درهم می شکنند؟

۱. دوری گزین  
 ۲. وابسته  
 ۳. نمایشی  
 ۴. پارانوئید

۲۳- شیوع اختلال شخصیت نمایشی چند درصد می باشد؟

۱. ۳ تا ۴ درصد  
 ۲. ۲ تا ۳ درصد  
 ۳. ۱ درصد  
 ۴. ۲/۵ درصد

۲۴- رفتارهایی نظیر بریدن بازوها، پاها و سوزاندن، در کدام دسته از اختلالات شخصیتی مشاهده می گردد؟

۱. ضد اجتماعی  
 ۲. اختلال شخصیت مرزی  
 ۳. اسکیزوتیید  
 ۴. وسواسی-جبری

۲۵- در کدام یک از اختلالات شخصیتی افراد در روابط بین فردی، به درجه بالایی از محبت نیاز دارند؟

۱. اسکیزوتیید  
 ۲. خود شیفته  
 ۳. نمایشی  
 ۴. اجتنابی

۲۶- کدامیک از مشکلات روانشناختی در بین مبتلایان به بی اشتهایی روانی شایع می باشد؟

۱. اضطراب  
 ۲. افسردگی شدید  
 ۳. خود شیفتگی  
 ۴. استرس

۲۷- تحریک کدام ناحیه باعث کاهش احساس گرسنگی می شود؟

۱. هیپوتالاموس  
 ۲. تالاموس  
 ۳. هیپوتالاموس شکمی  
 ۴. هیپوتالاموس جانبی

۲۸- کدام مورد جز اهداف مداخلات درمانی شناختی محسوب می شود؟

۱. ایجاد جذابیت جسمانی  
 ۲. کنترل فراخود  
 ۳. ایجاد اتحاد درمانی  
 ۴. رشد و پرورش خودمختاری

۲۹- در فاصله سنی ۲۵ تا ۴۴ سال مردها بطور متوسط چند کیلو گرم افزایش وزن دارند؟

۱. ۷  
 ۲. ۵  
 ۳. ۴  
 ۴. ۲

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۰- در کدام مرحله خواب non-REM مغز یک نوع الگوی فعالیت متمایزی از امواج آهسته تر به همراه خیزک های سریعی از امواج نشان می دهد؟

۱. اول ۰۱      ۲. دوم ۰۲      ۳. سوم ۰۳      ۴. چهارم ۰۴

۳۱- کدام مورد محرک اشتها و هوشیاری محسوب می شود؟

۱. سروتونین ۰۱  
۲. نوروترانسمیتر هیپوکرتین ۰۲  
۳. اپی نفرین ۰۳  
۴. دوپامین ۰۴

۳۲- لیومان و همکاران ۱۹۹۱ شیوع اختلال نعوظی را برای سنین ۴۰ الی ۴۹ سالگی چند درصد برآورد کرده اند؟

۱. ۱۱ درصد ۰۱      ۲. ۷ درصد ۰۲      ۳. ۱۳ درصد ۰۳      ۴. ۱۸ درصد ۰۴

۳۳- داروی ویگرا در درمان کدام اختلال موثر واقع می شود؟

۱. انزال زودرس ۰۱      ۲. بیضاری جنسی ۰۲      ۳. میل جنسی کم کار ۰۳      ۴. نعوظ ۰۴

۳۴- کدام گزینه جز عوارض جنبی داروی سیلدنافیل محسوب می شود؟

۱. کاهش ضربان قلب ۰۱      ۲. اختلال در دید رنگ ۰۲      ۳. برافروختگی چشم ها ۰۳      ۴. آشفته گی کلیوی ۰۴

۳۵- کدام دانشمند به این نتیجه دست یافت که مردان مبدل پوش به احتمال بیشتری نسبت به مردان دیگر والدین خود را فاقد ویژگی های مربوط به نوع جنس ارزیابی می کردند؟

۱. بن کرافت ۰۱      ۲. مسترز ۰۲      ۳. نیوکامب ۰۳      ۴. جانسون ۰۴

۳۶- در کدام نوع دمانس رفتارهای مشکل دار نظیر شگفتی واضح می باشند؟

۱. متوسط ۰۱      ۲. مبهم ۰۲      ۳. خفیف ۰۳      ۴. شدید ۰۴

۳۷- ژن های موجود در کروموزوم های ۱۴، ۱۹، ۲۱ در ایجاد کدام بیماری دخالت دارند؟

۱. پارکینسون ۰۱      ۲. آلزایمر ۰۲      ۳. ام اس ۰۳      ۴. صرع ۰۴

۳۸- عوامل خطر برای بروز زوال عقل در بیماران پارکینسونی شامل کدام مورد می شود؟

۱. جنسیت ۰۱      ۲. مدت زمان بیماری ۰۲      ۳. آستانه تحمل درد پایین ۰۳      ۴. ژنتیک ۰۴

۳۹- بی خوابی از جمله مشکلات روانی مبتلایان به کدام نوع بیماری می باشد؟

۱. ام اس ۰۱      ۲. صرع ۰۲      ۳. پارکینسون ۰۳      ۴. آلزایمر ۰۴



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۴- کدام دارو جز داروهای ضد صرع محسوب می شود؟

۰۴ پروکستین

۰۳ کاربامازپین

۰۲ سرتالین

۰۱ ترازودن

95-2

95-2

١٢١٧٠٦١

وضعت كليلد باسح صحيح د ج ب الف شماره سوال

سوال	الف	ب	ج	د	وضعت كليلد باسح صحيح
١		X			عادي ب
٢	X				عادي الف, ب, ج, د
٣		X			عادي ب
٤	X				عادي الف, ب, ج, د
٥	X				عادي الف
٦		X			عادي الف
٧			X		عادي ج
٨				X	عادي د
٩				X	عادي د
١٠				X	عادي د
١١	X				عادي الف
١٢	X				عادي الف
١٣			X		عادي ج
١٤				X	عادي الف, ب, ج, د
١٥		X			عادي ج
١٦			X		عادي الف, ب, ج, د
١٧				X	عادي الف
١٨				X	عادي د
١٩				X	عادي الف
٢٠				X	عادي الف, ب, ج, د
٢١				X	عادي د
٢٢				X	عادي ج
٢٣				X	عادي ب
٢٤				X	عادي ب
٢٥				X	عادي د
٢٦				X	عادي الف
٢٧				X	عادي ج
٢٨				X	عادي د
٢٩				X	عادي ج
٣٠				X	عادي ب
٣١				X	عادي ب
٣٢				X	عادي الف
٣٣				X	عادي د
٣٤				X	عادي ب
٣٥				X	عادي ج
٣٦				X	عادي الف
٣٧				X	عادي ب
٣٨				X	عادي ب
٣٩				X	عادي ج
٤٠				X	عادي ج



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
 سری سوال: یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی  
 روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰ - ۱۳۱۷۰۶۱

- ۱- دو نوع گسترده از اختلال های خلق که در DSM-۵ مطرح شده اند کدامند؟
۱. اختلال بی نظمی خلق ایذایی  
 ۲. اختلال دوقطبی  
 ۳. اختلال دوقطبی  
 ۴. اختلال ملال پیش قاعدگی
- ۲- یک دوره افسردگی اساسی اگر درمان نشود چند ماه طول می کشد؟
۱. ۵  
 ۲. ۶  
 ۳. ۴  
 ۴. ۳
- ۳- اختلال عاطفی فصلی با تغییر در کدام انتقال دهنده عصبی مغز ارتباط دارد؟
۱. سروتونین  
 ۲. ملاتونین  
 ۳. دوپامین  
 ۴. اپی نفرین
- ۴- برای تشخیص کدام اختلال، یک دوره افسردگی عمده و یک دوره شیدایی خفیف باید رخ دهد؟
۱. دو قطبی نوع ۲  
 ۲. دو قطبی نوع ۱  
 ۳. ادواری خوبی  
 ۴. افسردگی اساسی
- ۵- براساس بررسی های مربوط به فعال سازی کارکردی مغز، فعالیت کدام بخش در افراد مبتلا به افسردگی اساسی (MDD) بالاست؟
۱. کمر بند قدامی  
 ۲. بادامه  
 ۳. قشر پیش پیشانی  
 ۴. هیپوکامپ
- ۶- کدام یک از عوامل بین فردی درون خانواده منجر به عود افسردگی می شود؟
۱. حمایت اجتماعی بالا  
 ۲. فقدان حمایت اجتماعی  
 ۳. هیجان ابراز شده پائین  
 ۴. هیجان ابراز شده بالا
- ۷- چه کسی اعتقاد دارد که افسردگی با سه گانگان منفی درباره خود، جهان و آینده همراه است؟
۱. متالسکی  
 ۲. بک  
 ۳. آلوی  
 ۴. هاروی
- ۸- در کدام روش درمان افسردگی، بیمار ترغیب می شود که در فعالیت های لذت بخش شرکت کند؟
۱. فعال سازی رفتاری  
 ۲. درمان شناختی (CT)  
 ۳. روان درمانی بین فردی  
 ۴. جلسات گروهی (IPT)
- ۹- کدام داروی زیر به عنوان نخستین تثبیت کننده خلق شناخته می شود؟
۱. سرترالین  
 ۲. فلوگزتین  
 ۳. لیتیموم  
 ۴. الانزاپین
- ۱۰- کدامیک از انتقال دهنده های عصبی در اختلالهای خلقی نقش دارند؟
۱. نور اپی نفرین  
 ۲. دوپامین  
 ۳. سروتونین  
 ۴. هر سه مورد

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۱۱- احتمال مرگ ناشی از خودکشی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی چند برابر جمعیت عمومی است؟

۱۰ .۱ ۱۲ .۲ ۷ .۳ ۹ .۴

۱۲- کدام مورد از نشانه های منفی اسکیزوفرنی نیست؟

۱ . افت عاطفی ۲ . بی ارادگی ۳ . توهمات ۴ . ناگویی

۱۳- آمیزه ای از اسکیزوفرنی و اختلال های خلق چه نامیده می شود؟

۱ . اسکیزوفرنی شکل ۲ . روان پریشی کوتاه مدت  
۳ . اسکیزوافکتیو ۴ . اختلال هذیانی

۱۴- مطابق نظریه دوپامین، گیرنده های دوپامینی افراد اسکیزوفرن چه اندازه است؟

۱ . کم ۲ . زیاد ۳ . متوسط ۴ . کمتر از حد لازم

۱۵- کدام مورد، از خصوصیات مادر اسکیزوفرنی زاد نمی باشد؟

۱ . سرد ۲ . سلطه گر ۳ . اضطرابی ۴ . تعارض آفرین

۱۶- اولین داروی ضد روان پریشی نسل دوم برای درمان اسکیزوفرنی کدام است؟

۱ . کلوزاپین ۲ . اولانزاپین ۳ . ریسپریدون ۴ . کلرپرومازین

۱۷- وقتی که از فرد مبتلا به اسکیزوفرنی خواسته می شود تا صحت باورهای هذیانی خویش را نسبت به افراد غیر مبتلا بیازماید، از کدام رویکرد درمانی استفاده شده است؟

۱ . رفتاردرمانی شناختی ۲ . آموزش مهارت های اجتماعی  
۳ . خانواده درمانی ۴ . ترمیم شناختی

۱۸- رویکرد رفتاری در خصوص سبب شناسی اختلال های زیاده دوست بر کدام مورد تأکید می کند؟

۱ . شرطی شدن عامل ۲ . شرطی شدن کلاسیک ۳ . رفتار سرمشق ۴ . شرطی سازی کنشگر

۱۹- کدام گزینه در شمار اختلال های برون شده مربوط به اختلال های دوران کودکی نمی باشد؟

۱ . پرخاشگری ۲ . فزونکاری ۳ . تکانشوری ۴ . اضطراب

۲۰- گسترده ترین مداخله برای خوانش پریشی و محاسبه پریشی چیست؟

۱ . سرمش دهی ۲ . مداخلات تربیتی  
۳ . مداخلات بالینی ۴ . درمان شناختی-رفتاری

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

- ۲۱- کدام دامنه سنی نسبت به گروه های سنی دیگر در حالت کلی اختلال های روانی کمتری دارند؟
۱. بالای ۶۵ سال      ۲. زیر ۶۵ سال      ۳. بالای ۷۰ سال      ۴. زیر ۲۰ سال
- ۲۲- در سبب شناسی بیماری آلزایمر کدام عامل نقش اصلی ایفا می کند؟
۱. سابقه افسردگی      ۲. استرس      ۳. زن ها      ۴. سالخوردگی
- ۲۳- اختلال شخصیت اسکیزوتیپ و اسکیزوتایپال در زیر مجموعه کدام دسته اختلالات شخصیتی قرار دارند؟
۱. هیجانی و خودنما      ۲. ترسو و مضطرب      ۳. عجیب و غریب      ۴. اسکیزوفرنیا
- ۲۴- سطح شیوع کدام اختلال شخصیت با افزایش سن پائین می آید؟
۱. پارانوئید      ۲. وابسته      ۳. وسواسی-جبری      ۴. ضداجتماعی
- ۲۵- جمله ی: «من برای بقاء نیازمند به دیگران- به ویژه فرد قوی- هستم.» جزو باورهای کدام تیپ شخصیتی می باشد؟
۱. وابسته      ۲. ضعیف      ۳. اسکیزوتیپ      ۴. خودشیفته
- ۲۶- ابتلاء به اختلال شخصیت مرزی چند درصد جمعیت عمومی را تشکیل می دهد؟
۱. ۲      ۲. ۳      ۳. ۴      ۴. ۱
- ۲۷- در کدام نوع درمان، شناخت ها و طرح واره های شناختی زیربنایی که منجر به رفتارهای نامناسب می گردند، تغییر می یابند؟
۱. رفتاری      ۲. شناختی-رفتاری      ۳. آموزش آگاهی هیجانی      ۴. شناختی
- ۲۸- براساس پژوهش های انجام شده کدام مسأله برای افراد مبتلا به بی اشتهایی روانی یک مشغله ذهنی طولانی مدت است؟
۱. ترس از چاق شدن      ۲. کنترل وزن      ۳. قطع عادت ماهانه      ۴. امتناع از نگهداری وزن
- ۲۹- کدام گزینه از ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای پراشتهایی روانی نمی باشد؟
۱. دوره های تکراری پرخوری      ۲. ادراک های جسمی آشفته در مورد وزن و شکل بدن      ۳. تأثیر زیاد وزن بر روی ارزیابی از خویشتن      ۴. رفتارهای نامناسب جبرانی بعد از خوردن

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۳۰- نقش محور HPA (هیپوتالاموس - هیپوفیز - قشر فوق کلیوی) چیست؟

۱. واکنش در برابر فشار روانی  
 ۲. آزاد کردن سروتونین  
 ۳. تنظیم هیجانی  
 ۴. کنترل هورمونهای اضافی در بدن

۳۱- تبیین های روان تحلیل گری تثبیت در کدام مرحله را موجب ابتلاء به بی اشتهایی روانی می دانند؟

۱. آلتی  
 ۲. دهانی  
 ۳. مقعدی  
 ۴. نهفتگی

۳۲- کدام داروها برای درمان اختلالات تغذیه ای سودمند هستند؟

۱. ضد افسردگی ها  
 ۲. لیتیوم  
 ۳. داروهای ضد اضطراب  
 ۴. داروهای ضد استفراغ

۳۳- خواب عمیق کدام مراحل خواب NON-REM را شامل می شود؟

۱. ۳و۱  
 ۲. ۴  
 ۳. ۲و۱  
 ۴. ۴و۳

۳۴- کدام یک از روش های زیر شیوه مؤثری در درمان بی خوابی اولیه است؟

۱. دارودرمانی  
 ۲. درمان مجدد محدودسازی خواب  
 ۳. درمان آرمیدگی  
 ۴. شرطی شدن مجدد

۳۵- بیماران مبتلا به نارکولپسی با کمبود کدام نوروترانسمیتر مواجه هستند؟

۱. هیپوکرتین  
 ۲. نوراپی نفرین  
 ۳. سروتونین  
 ۴. استیل کولین

۳۶- کدام نوع درمان برای اختلال وحشت شبانه و خواب گردی مناسب است؟

۱. شرطی سازی  
 ۲. روان درمانی فردی و خانوادگی  
 ۳. دارو درمانی  
 ۴. از بین بردن رویدادهای استرس زا

۳۷- اولین اختلال در طبقه بندی اختلالات مربوط به میل جنسی کدام است؟

۱. انزال زودرس  
 ۲. اختلال میل جنسی کم کار  
 ۳. واژینیسم  
 ۴. اختلال بیضاری جنسی

۳۸- مبتلایان به انواع اختلالات پارافیلی طی چه مدت می توانند تشخیص داده شوند؟

۱. ۱سال  
 ۲. ۱ماه  
 ۳. ۶ماه  
 ۴. ۲سال



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۳۹- در سبب شناسی روان تحلیلی یادگار خواهی جنسی همراه با مبدل پوشی، کدام مکانیزم دفاعی قابل مشاهده است؟

۱. سرکوب      ۲. فرافکنی      ۳. واپس زنی      ۴. برگشت

۴۰- اختلال هویت جنسی در کدام سطوح سنی بیشتر شایع است؟

۱. جوانان      ۲. کودکان      ۳. بزرگسالان      ۴. نوجوانان

96-1

وضعت	کلید	باسخ	صحیح	د	ج	ب	الف	شماره	سوال
عادي	ج					X		١	
عادي	الف					X		٢	
عادي	ب					X		٣	
عادي	الف					X		٤	
عادي	ب					X		٥	
عادي	د					X		٦	
عادي	ب					X		٧	
عادي	الف						X	٨	
عادي	ج					X		٩	
عادي	د					X		١٠	
عادي	ب					X		١١	
عادي	ج					X		١٢	
عادي	ج					X		١٣	
عادي	ب					X		١٤	
عادي	ج					X		١٥	
عادي	الف					X		١٦	
عادي	الف					X		١٧	
عادي	ب					X		١٨	
عادي	د					X		١٩	
عادي	ب					X		٢٠	
عادي	الف					X		٢١	
عادي	ج					X		٢٢	
عادي	ج					X		٢٣	
عادي	د					X		٢٤	
عادي	الف					X		٢٥	
عادي	الف					X		٢٦	
عادي	د					X		٢٧	
عادي	ب					X		٢٨	
عادي	ب					X		٢٩	
عادي	الف					X		٣٠	
عادي	ب					X		٣١	
عادي	الف					X		٣٢	
عادي	د					X		٣٣	
عادي	ج					X		٣٤	
عادي	الف					X		٣٥	
عادي	ب					X		٣٦	
عادي	ب					X		٣٧	
عادي	ج					X		٣٨	
عادي	د					X		٣٩	
عادي	ب					X		٤٠	

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی  
روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰، ۱۳۱۷۰۶۱

۱- اختلال شخصیت پارانوئید مربوط به کدام یک از دسته های زیر می باشد؟

۱. هیجانی و خودنما ۰۲ عجیب و غریب ۰۳ ترسو یا مضطرب ۰۴ پر زرق و برق

۲- علامت بارز این اختلال تنهایی مفرط و پرهیز از روابط اجتماعی است؟

۱. اسکیزوئید ۰۲ اسکیزوتایپال ۰۳ اجتنابی ۰۴ ضد اجتماعی

۳- این اختلال شخصیت الگوی فراگیری از بی ثباتی در روابط بین فردی در تصویر خویشتن و در عاطفه و تکانش وری بارز تعریف می شود؟

۱. ضد اجتماعی ۰۲ مرزی ۰۳ خود شیفته ۰۴ نمایشی

۴- به نظر می رسد موثرترین مداخلات روان شناختی، آنهایی هستند که به چه چیزی معطوف می شوند؟

۱. خود فرد ۰۲ خانواده ۰۳ جامعه ۰۴ روان شناسی

۵- مهمترین درمان ناکولپسی کدام است؟

۱. آرمیدگی ۰۲ دارودرمانی ۰۳ شناختی-رفتاری ۰۴ شرطی شدن مجدد

۶- افراد مبتلا به کدام اختلال شخصیت نیاز دائم به اتکاء دارند؟

۱. وابسته ۰۲ مرزی ۰۳ ضدا اجتماعی ۰۴ وسواسی

۷- مبتلایان به اختلال هویت جنسی در برابر کدام درمان مقاوم هستند؟

۱. دارودرمانی ۰۲ بیزاری درمانی ۰۳ درمان شناختی ۰۴ روان درمانی

۸- صفت کمال گرایی در مبتلایان به کدام اختلال شخصیت دیده می شود؟

۱. اسکیزوئید ۰۲ اسکیزوتایپال ۰۳ وسواسی-جبری ۰۴ پارانوئید

۹- معمولا خواب با کدام یک از انواع خواب شروع می شود؟

۱. خواب با حرکات سریع چشم ۰۲ خواب متناقض  
۳. خواب NONREM ۰۴ خواب REM

۱۰- منظور از خواب متناقض کدام یک از انواع خواب ها می باشد؟

۱. متعارف ۰۲ NON REM ۰۳ REM ۰۴ خواب با امواج کوتاه

تعداد سوالات: تستی: ۴۰؛ تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰؛ تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

- ۱۱- اختلال های خواب به طور کلی بر اساس سبب شناسی آنها به چند بخش عمده طبقه بندی می شوند؟  
 ۱. 5      ۲. 3      ۳. 4      ۴. 2
- ۱۲- نارکولپسی مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟  
 ۱. بی خوابی      ۲. بد خوابی      ۳. حمله خواب      ۴. وقفه تنفسی
- ۱۳- به حالتی گفته می شود که در آن فرد در ثلث اول شب در حالت خواب عمیق به طور ناگهانی از خواب بیدار می شود؟  
 ۱. کابوس      ۲. خواب گردی      ۳. وحشت شبانه      ۴. بی خوابی
- ۱۴- در کدام یک از اختلالات جنسی بیمار به وسیله استفاده از اشیای بی جان به ارضای تمایلات جنسی خود می پردازد؟  
 ۱. سادیسم      ۲. مازوخیسم      ۳. یادگار خواهی      ۴. سادیسم مازوخیسم
- ۱۵- GID مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟  
 ۱. اختلال هویت جنسی      ۲. اختلال وسواس  
 ۳. اختلال شخصیت      ۴. اختلال اضطراب فراگیر
- ۱۶- مهم ترین نظریه پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام یک از گزینه ها می باشد؟  
 ۱. نظریه یادگیری      ۲. نظریه شناختی      ۳. نظریه روان کاوی      ۴. نظریه انسان گرایی
- ۱۷- رایج ترین علت اختلال نعوظی در مردان چیست؟  
 ۱. شناختی      ۲. روان شناختی      ۳. جسمی      ۴. ژنتیکی
- ۱۸- کدام یک از اختلال های زیر به DSM5 اضافه شده است؟  
 ۱. ادوارخویی      ۲. وسواس فکری و عملی      ۳. بی نظمی خلق ایذایی      ۴. اضطراب خاص
- ۱۹- اختلال افسردگی اساسی در DSM5 به مدت حداقل چند هفته می باشد؟  
 ۱. 2      ۲. 3      ۳. 4      ۴. 5
- ۲۰- اختلال عاطفی فصلی مربوط به کدام هورمون های زیر می باشد؟  
 ۱. رشد      ۲. تروکسین      ۳. آندروژن      ۴. ملاتونین
- ۲۱- اساساً بسیار شایع است که افسردگی به دنبال کدام بیماری پدیدار می شود؟  
 ۱. فشار خون      ۲. آسم      ۳. قلبی - عروقی      ۴. زخم معده



تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی  
 ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۲۲- منظور از هیپومانیا کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. شیدایی متوسط      ۲. شیدایی خفیف      ۳. شیدایی شدید      ۴. دو قطبی خفیف

۲۳- اختلال افسردگی پایدار دست کم باید چه مدت پایدار بماند؟

۱. 2 هفته      ۲. 2 سال      ۳. 1 سال      ۴. 1 هفته

۲۴- کدام یک از اختلالهای زیر در زمره اختلالهایی هستند که بیشترین وراثت پذیری را دارند؟

۱. افسردگی      ۲. اضطراب      ۳. دو قطبی      ۴. فوبی

۲۵- کدام یک از انتقال دهنده های زیر در اختلالهای خلقی احتمالی شان مورد مطالعه قرار گرفته است؟

۱. سروتونین      ۲. اپی نفرین      ۳. هیستامین      ۴. ملاتونین

۲۶- کدام یک از انتقال دهنده های زیر نقش مهمی در میزان حساسیت دستگاه پاداش در مغز ایفا می کند؟

۱. هیستامین      ۲. نوراپی نفرین      ۳. سروتونین      ۴. دوپامین

۲۷- کدام گزینه به شخص کمک می کند تا میزان اهمیت هیجانی یک محرک را بسنجد؟

۱. تالاموس      ۲. بادامه      ۳. هیپوتالاموس      ۴. هیپو کامپ

۲۸- کدام گزینه هورمون اصلی فشار روانی است؟

۱. پرولاکتین      ۲. اکسی توسین      ۳. تیروکسین      ۴. کورتیزول

۲۹- کدام یک از افراد زیر اعتقاد دارد که افسردگی با 3 کانگان منفی همراه است؟

۱. آدلر      ۲. راجرز      ۳. فروید      ۴. بک

۳۰- کدام گزینه در مورد تثبیت کننده خلق صحیح می باشد؟

۱. به داروهایی که نشانه های شیدایی را افزایش می دهند.      ۲. به داروهایی که نشانه های شیدایی را کاهش می دهند.  
 ۳. به داروهایی که نشانه های افسردگی را کاهش می دهند.      ۴. به داروهایی که نشانه های افسردگی را افزایش می دهند.

۳۱- پژوهش شده ترین درمان برای اختلال دو قطبی کدام گزینه می باشد؟

۱. دیازپام      ۲. لیتیوم      ۳. امی پرامین      ۴. آمی تربیتیلین

۳۲- کدام گزینه جزء نشانه های مثبت اسکیزو فرنیا می باشد؟

۱. هذیان      ۲. اوتیسم      ۳. خلق نامناسب      ۴. دوگانگی احساس

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۳۳- نظریه نشخوار ذهنی از کیست؟

۱. بک      ۲. سوزان نولن- هوکسما      ۳. سلیگمن      ۴. آبرامسون

۳۴- کدامیک از موارد زیر، مقدار لذتی اشاره دارد که در دم یا لحظه ی حضور چیزی لذت بخش تجربه می شود؟

۱. لذت کاذب      ۲. لذت پایانی      ۳. لذت انتظاری      ۴. لذت ابتدایی

۳۵- بررسی های مربوط به معاینات پس از مرگ روی مغز ابتلا به کدام اختلال همواره نشان دهنده بطن های بزرگ بوده اند؟

۱. اسکیزوفرنیا      ۲. PTSD      ۳. وسواس      ۴. افسردگی

۳۶- منظور از داروهای نورولپتیک کدام گزینه می باشد؟

۱. ضد اضطراب ها      ۲. ضد افسردگی ها      ۳. ضد روان رنجور      ۴. ضد روان پریشی

۳۷- کدام یک از داروها از دهه 1950 به طور گسترده ای برای درمان اسکیزوفرنی مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. ریتالین      ۲. فلوکسیتین      ۳. فنو تیازین      ۴. متیل فنیدیت

۳۸- نوید بخش ترین درمان ویژه اختلال های زیاده دوست کدام گزینه می باشد؟

۱. رفتاری      ۲. شناختی      ۳. شناختی - رفتاری      ۴. روان کاوی

۳۹- عبارت است از وجود یک الگوی دایمی از بی توجهی و یا فزون کاری و تکانش گری که نسبت به آنچه در کودکان متعلق به یک دوره سنی مشاهده می شود؟

۱. ADHD      ۲. SAD      ۳. اختلال شخصیت ضد اجتماعی      ۴. اختلال سلوک

۴۰- در این اختلال کارکرد هوشی و عقلی بیمار کاهش می یابد و حافظه، تفکر انتزاعی و قضاوت او رو به تباهی می گذارد؟

۱. آلزایمر      ۲. زوال عقل      ۳. روان آشفتگی      ۴. دلیریوم

96-2

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	د ج ب	الف	شماره سوال
عادی	ب		X	۱
عادی	الف		X	۲
عادی	ب		X	۳
عادی	ب		X	۴
عادی	ب		X	۵
عادی	الف		X	۶
عادی	د		X	۷
عادی	ج		X	۸
عادی	ج		X	۹
عادی	ج		X	۱۰
عادی	ج		X	۱۱
عادی	ج		X	۱۲
عادی	ج		X	۱۳
عادی	ج		X	۱۴
عادی	الف		X	۱۵
عادی	الف		X	۱۶
عادی	ب		X	۱۷
عادی	ج		X	۱۸
عادی	الف		X	۱۹
عادی	د		X	۲۰
عادی	ج		X	۲۱
عادی	ب		X	۲۲
عادی	ب		X	۲۳
عادی	ج		X	۲۴
عادی	الف		X	۲۵
عادی	د		X	۲۶
عادی	ب		X	۲۷
عادی	د		X	۲۸
عادی	د		X	۲۹
عادی	ب		X	۳۰
عادی	ب		X	۳۱
عادی	الف		X	۳۲
عادی	ب		X	۳۳
عادی	ب		X	۳۴
عادی	الف		X	۳۵
عادی	د		X	۳۶
عادی	ج		X	۳۷
عادی	ج		X	۳۸
عادی	الف		X	۳۹
عادی	ب		X	۴۰

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۱- کدام گزینه مربوط به دسته رشد هیجانی ، خود نما می باشد؟

۱. پارانوئید ۲. مرزی ۳. وابسته ۴. اسکیزوئید

۲- در کدام دسته از اختلالات شخصیتی ، تحت تاثیراسترس ، واقعیت سنجی فرد به آسانی درهم می شکند؟

۱. اختلال شخصیت اجتنابی ۲. اختلال شخصیت نمایشی  
۳. اختلال شخصیت وابسته ۴. اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

۳- اختلال شخصیت مرزی ، معمولاً در کدام دوره ی زندگی فرد شروع می شود؟

۱. کودکی ۲. بزرگسالی ۳. نوجوانی ۴. میانسالی

۴- افراد مبتلا به کدام دسته از اختلال شخصیتی ، معمولاً شغل های حاشیه ای انتخاب می کنند ، پیشرفت کمی دارند ولی در حرفه شان راضی بنظر می رسند؟

۱. اختلال شخصیت وسواسی - جبری ۲. اختلال شخصیت ضد اجتماعی  
۳. اختلال شخصیت وابسته ۴. اختلال شخصیت دوری گزین

۵- مازوخیست های اخلاقی چه زمانی احساس لذت می کنند؟

۱. وقتی مورد تحقیر دیگران قرار گیرند. ۲. وقتی خشونت فیزیکی انجام دهند.  
۳. وقتی با دیگران بصورت پرخاشگرانه رفتار کنند. ۴. وقتی دیگران را مورد تحقیر قرار می دهند.

۶- کدامیک از موارد زیر ، جزء ویژگی اصلی اختلال شخصیتی نمایشی محسوب می شود؟

۱. حسود و پرنخوت ۲. تجربه هیجانی سطحی  
۳. احساس عدم کفایت ۴. رفتارهای اغواگری جنسی متناسب

۷- اسب آبی مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. هیپوکامپ ۲. بادامه ۳. مخچه ۴. سیستم لیمبیک

۸- در نزدیکی های صبح کل دوره خواب فرد ، در کدامیک از مراحل زیر سپری می شود؟

۱. در مراحل 1 و 2 و 3 ۲. در مراحل 1 و 2 و خواب REM  
۳. در مراحل 2 و 3 خواب REM ۴. در مراحل 2 و 3 خواب NREM

۹- از بین رفتن ناگهانی قوام عضلانی چه نامیده می شود؟

۱. تجربه کاتاپلکسی ۲. هیپناگوژیک ۳. هیپنوپامیک ۴. آپنه

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰، زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰، سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - مشاوره، روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۱۰- در کدامیک از انواع پارافیلیا، فرد با رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رساندن نسبت به موضوع جنسی خود، به برانگیختگی جنسی دست می یابد؟

۱. مازوخسیم جنسی      ۲. نمایشگری جنسی      ۳. سادیسم جنسی      ۴. یادگارخواهی جنسی

۱۱- مهمترین درمان دارویی شناخته شده برای اختلال نعوظی چه می باشد؟

۱. کلوزاپین      ۲. سیلدنافیل      ۳. دسی پرامین      ۴. پروزاک

۱۲- کدامیک از نظریه های زیر، عمدتاً به فرآیند تقویت رفتارهای جنسی مقابل در کودکان از سوی والدین تاکید دارد؟

۱. شناختی      ۲. شرطی شدن در مراحل اولیه زندگی  
۳. روان تحلیلی      ۴. زیست شناختی

۱۳- در کدامیک از اختلالات زیر، باید دست کم در طول زندگی یک دوره ی هیپومانیک و یک دوره ی افسردگی اساسی وجود داشته باشد؟

۱. اختلال دو قطبی II      ۲. اختلال دو قطبی I      ۳. افسرده خویی      ۴. ادواری خویی

۱۴- افسردگی با کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیر ارتباط دارد؟

۱. سطوح بالای نور اپی نفرین و دو پامین      ۲. سطوح پایین نور اپی نفرین و دو پامین  
۳. سطوح بالای ملاتونین و دو پامین      ۴. سطوح بالای نور اپی نفرین و سروتونین

۱۵- داروهای ضد افسردگی چند روز زمان نیاز دارند تا افسردگی را کاهش دهند؟

۱. 10 تا 20 روز      ۲. 28 روز      ۳. 15 روز      ۴. 7 تا 14 روز

۱۶- تریپتوفان، ماده پیشتاز اصلی کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیر است؟

۱. اپی نفرین      ۲. استیل کولین      ۳. سروتونین      ۴. دوپامین

۱۷- کدامیک از موارد زیر به شخص کمک می کند تا میزان اهمیت هیجانی یک محرک را بسنجد؟

۱. هیپوکامپ      ۲. بادامه      ۳. تالاموس      ۴. هیپوتالاموس

۱۸- هورمون اصلی فشار روانی چیست؟

۱. کورتیزول      ۲. تیروکسین      ۳. آدرنالین      ۴. گونادوتروفین

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
 رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۱۹- در کدام یک از نظریه های زیر ، افکار و باورهای منفی علت عمده ی افسردگی تلقی می گردند؟

۱. نظریه های روانکاوی  
 ۲. نظریه های شناختی  
 ۳. نظریه های کنش گرایی  
 ۴. نظریه های زیستی

۲۰- کدامیک از روانشناسان زیر اعتقاد دارد که افسردگی با سه گانگان منفی همراه است؟

۱. یونگ  
 ۲. سلیگمن  
 ۳. فروید  
 ۴. آرون بک

۲۱- کدامیک از عوامل زیر می تواند افزایش نشانه های شیدایی در طول زمان را پیش بینی کند؟

۱. محرومیت از پاداش  
 ۲. هیجان ابراز شده  
 ۳. عدم حمایت اجتماعی  
 ۴. محرومیت از خواب

۲۲- در کدام یک از فنون زیر ، فرد ترغیب می شود در فعالیت های لذت بخشی شرکت جوید که می توانند افکار مثبتی را درباره ی خویشتن و زندگی بوجود آورند؟

۱. فعال سازی شناختی  
 ۲. فعال سازی روانی  
 ۳. فعال سازی رفتاری  
 ۴. فعال سازی هیجانی

۲۳- کدامیک از درمان های زیر ، به خانواده در زمینه بیماری اختلال دوقطبی آموزش می دهد، پیام رسانی های خانواده را بالا می برد و مهارت های مساله گشایی را ایجاد می کند؟

۱. FFT  
 ۲. CT  
 ۳. IPT  
 ۴. ECT

۲۴- شایع ترین و پژوهش شده ترین درمان زیستی یا غیر زیستی مورد استفاده در اختلالهای افسردگی کدام مورد زیر است؟

۱. درمان شناختی - رفتاری  
 ۲. درمان بین فردی  
 ۳. دارو درمانی  
 ۴. درمان روان تحلیلی

۲۵- کدامیک از داروهای زیر ، نخستین تثبیت کننده ی خلقی شناخته شده است؟

۱. دیپاکوت  
 ۲. الانزاپین  
 ۳. لیتیوم  
 ۴. سرتالین

۲۶- کدامیک از رویکردهای زیر ، نوید بخش ترین درمان برای کاهش گرایشات خود کشی ، به شمار می آیند؟

۱. تکاملی  
 ۲. بینش محور  
 ۳. شناختی - رفتاری  
 ۴. زیستی

۲۷- کدامیک از موارد زیر ، مقدار لذتی اشاره دارد که در دم یا در لحظه ی حضور چیزی لذت بخش، تجربه می شود؟

۱. لذت پایانی  
 ۲. لذت کاذب  
 ۳. لذت انتظاری  
 ۴. لذت ابتدایی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - مشاوره، روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۲۸- افت عاطفی به چه چیزی اشاره دارد؟

۱. به فقدان تجلی بیرونی هیجان  
 ۲. به فقدان تجلی درونی هیجان  
 ۳. به فقدان ماهیت هیجان  
 ۴. به فقدان تجلی درونی و معکوس هیجان

۲۹- حوزه ای که شامل جلوه ی بیرونی هیجانات و آواگری می شود چه نام دارد؟

۱. حوزه دریافتی  
 ۲. حوزه تجربه ای  
 ۳. حوزه روانی  
 ۴. حوزه بیانی

۳۰- خطر ابتلا به اسکیزوفرنی در جمعیت عمومی چند درصد است؟

۱. اندکی بیشتر از 1 درصد  
 ۲. 2 درصد  
 ۳. 8 درصد  
 ۴. اندکی کمتر از 1 درصد

۳۱- کدامیک از موارد زیر در رفتارهایی مانند گفتار، تصمیم گیری، هیجان و رفتارهای هدفمند نقش دارد؟

۱. قشر گیجگاهی  
 ۲. قشر آهیانه  
 ۳. قشر پیش پیشانی  
 ۴. قشر پس سری

۳۲- یکی از عوامل محیطی که در میان نوجوانان به عنوان عامل خطر بار برای اسکیزوفرنی مورد بررسی قرار گرفته است کدام مورد زیر می باشد؟

۱. کوکائین  
 ۲. آمفتامین  
 ۳. کانابیس  
 ۴. ال اس دی

۳۳- ناتوانی در آرام و قرار داشتن را چه می نامند؟

۱. آکاتزی  
 ۲. دیسکینزی  
 ۳. دیستونی  
 ۴. کاتاپلکسی

۳۴- در عارضه ای به نام نشانگان بدخیم نورولپتیک، کدامیک از موارد زیر رخ می دهد؟

۱. ضربان قلب کاهش می یابد.  
 ۲. ضربان قلب بالا می رود...  
 ۳. کاهش وزن  
 ۴. کاهش فشار خون

۳۵- داروی کلوزاپین، در کدام طبقه ی دارویی برای درمان اسکیزوفرنی جای دارد؟

۱. داروهای نسل اول  
 ۲. داروهای نسل سوم  
 ۳. داروهای نسل دوم  
 ۴. داروهای نسل چهارم

۳۶- حالت سرخوشی یا تحریک پذیری شدید مربوط به کدام اختلال است؟

۱. افسردگی  
 ۲. شیدایی  
 ۳. دوقطبی نوع 1  
 ۴. دوقطبی نوع 2

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - مشاوره ، روانشناسی ۱۳۱۷۲۴۰

۳۷- کدامیک از اختلالات زیر ، جزء اختلال های اصلی زیاده دوست در DSM-5 می باشد؟

۱. اختلال یادگار پرستی  
۲. اختلال نعوظی  
۳. اختلال دخول تناسلی-لگنی  
۴. اختلال ارگاسمی

۳۸- افسردگی با سطح پایین با کدام انتقال دهنده ارتباط دارد؟

۱. اپی نفرین  
۲. آدرنالین  
۳. سروتونین  
۴. استیل کولین

۳۹- گسترده ترین مداخله برای خوانش پریشی و محاسبه پریشی چه می باشد؟

۱. مداخلات شناختی  
۲. مداخلات تربیتی  
۳. مداخلات روانی  
۴. مداخلات رفتاری

۴۰- کدامیک از موارد زیر با شروع ناگهانی مشکلات توجه و آگاهی تعریف می شود؟

۱. ام اس  
۲. دلیریوم  
۳. زوال عقل عروقی  
۴. پارکینسون



97-1

وضوحیت کلید	یاسخ صحیح	د	ج	ب	الف	شماره سوال
۱	عادي				ب	۱
۲	عادي				ب	۲
۳	عادي				ج	۳
۴	عادي				د	۴
۵	عادي				الف	۵
۶	عادي				ب	۶
۷	عادي				الف	۷
۸	عادي				ب	۸
۹	عادي				الف	۹
۱۰	عادي				ج	۱۰
۱۱	عادي				ب	۱۱
۱۲	عادي				ب	۱۲
۱۳	عادي				الف	۱۳
۱۴	عادي				ب	۱۴
۱۵	عادي				د	۱۵
۱۶	عادي				ج	۱۶
۱۷	عادي				ب	۱۷
۱۸	عادي				الف	۱۸
۱۹	عادي				ب	۱۹
۲۰	عادي				د	۲۰
۲۱	عادي				د	۲۱
۲۲	عادي				ج	۲۲
۲۳	عادي				الف	۲۳
۲۴	عادي				ج	۲۴
۲۵	عادي				ج	۲۵
۲۶	عادي				ج	۲۶
۲۷	عادي				الف	۲۷
۲۸	عادي				الف	۲۸
۲۹	عادي				د	۲۹
۳۰	عادي				د	۳۰
۳۱	عادي				ج	۳۱
۳۲	عادي				ج	۳۲
۳۳	عادي				الف	۳۳
۳۴	عادي				ب	۳۴
۳۵	عادي				ج	۳۵
۳۶	عادي				ب	۳۶
۳۷	عادي				الف	۳۷
۳۸	عادي				ج	۳۸
۳۹	عادي				ب	۳۹
۴۰	عادي				ب	۴۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی  
 روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰ - مشاوره ۱۳۱۷۰۶۱

۱- ویژگی اصلی کدام اختلال شخصیت، الگوی پایداری از سوءظن و عدم اعتماد به دیگران است؟

۱. پارانویا      ۲. ضد اجتماعی      ۳. اسکیزوئید      ۴. دوری گزین

۲- مهمترین ناحیه دخیل در افسردگی می باشد؟

۱. سیستم لیمبیک      ۲. تالاموس      ۳. هیپو تالاموس      ۴. هیپوفیز

۳- کدام گزینه معمولا مشهورترین نشانه اسکیزوفرنی است؟

۱. آشفتگی در فرایندهای فکری      ۲. توهم  
 ۳. گفتار آشفته      ۴. فقدان عاطفه

۴- فرضیه دوپامین مربوط به کدام اختلال است؟

۱. اسکیزوفرنی      ۲. MDD  
 ۳. اختلال بی نظمی خلقی ایذایی      ۴. اختلال دو قطبی

۵- برخی از مطالعات استرس مادر را در به وجود آمدن این اختلال دخیل دانسته اند؟

۱. فوبی      ۲. افسردگی      ۳. وسواس      ۴. اسکیزوفرنیا

۶- یکی از ناتوان کننده ترین اختلال های مربوط به بهداشت روانی است؟

۱. افسردگی      ۲. شیدایی      ۳. اسکیزوفرنی      ۴. MDD

۷- DSM-IV-TR ده نوع اختلال شخصیتی را در چند خوشه معرفی می کند؟

۱. 3      ۲. 2      ۳. 4      ۴. 5

۸- معمولا خواب non-REM به چند مرحله کوچکتر تقسیم می شود؟

۱. 2      ۲. 3      ۳. 5      ۴. 4

۹- برای تشخیص این بیماری نقص ها باید به یک آسیب در کارکرد اجتماعی منجر گردد؟

۱. آلزایمر      ۲. صرع      ۳. پارکینسون      ۴. MS

۱۰- دومین اختلال شایع عصب شناختی بعد از سکته است؟

۱. پارکینسون      ۲. صرع      ۳. الزایمر      ۴. زوال عقل

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰

- ۱۱- شایع ترین نوع اسکیزوفرنیا کدام گزینه است؟  
۱. نوع پارانوئید ۲. نوع آشفته ۳. نوع کاتانویک ۴. نوع باقی مانده
- ۱۲- یکی از مباحثه انگیزترین و شدیدترین اختلال های روانی است؟  
۱. افسردگی ۲. مانیا ۳. اسکیزوفرنی ۴. وسواس
- ۱۳- SAD مربوط به کدام اختلال است؟  
۱. اختلال اسکیزوفرنی شکل ۲. اختلال اسکیزوافکتیو ۳. اختلال هذیائی ۴. اختلال افسردگی فصلی
- ۱۴- از نظر چه کسی خودکشی نشان دهنده یک آرزوی سرکوب شده برای کشتن یک موضوع محبوب از دست رفته است؟  
۱. بک ۲. سلیگمن ۳. فروید ۴. اریکسون
- ۱۵- هم اکنون چند دسته داروی ضد افسردگی به کار می رود؟  
۱. 2 ۲. 3 ۳. 4 ۴. 5
- ۱۶- کدام انتقال دهنده ها از نظر زیست شناختی در سبب شناسی افسردگی دخیل دانسته شده اند؟  
۱. دوپامین و استیل کولین ۲. دوپامین و گابا ۳. اپی نفرین و نور اپی نفرین ۴. نور اپی نفرین و سروتونین
- ۱۷- در کدام اختلال شخصیتی افراد، هیجانی، خودنما و پرزرق و برق هستند؟  
۱. پارانوئید ۲. وابسته ۳. وسواسی- جبری ۴. مرزی
- ۱۸- کدام اختلال رایجترین اختلال روانی می باشد؟  
۱. اضطراب ۲. فوبی ۳. وسواس ۴. افسردگی
- ۱۹- معمولاً اختلالات شخصیت از چه سنی قابل تشخیص است؟  
۱. هفت سال به بالا ۲. پانزده سال به بالا ۳. هیجده سال به بالا ۴. بیست و پنج سال به بالا
- ۲۰- ویژگی کدام دسته از اختلالات شخصیت، عجیب و غریب یا نامتعارف بودن است؟  
۱. وابسته ۲. نمایشی ۳. دوری گزین ۴. پارانوئید

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰

۲۱- در کدام نوع از اختلالات شخصیت، خویشتن از نظر اجتماعی ناکارآمد و بی تفاوت است؟

۱. ضد اجتماعی      ۲. وابسته      ۳. اسکیزوئید      ۴. پارانوئید

۲۲- کدام مورد به عنوان اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه معروف است؟

۱. اسکیزوئید      ۲. اسکیزوتایپال      ۳. مرزی      ۴. دوری گزین

۲۳- قبلاً به کدام اختلال شخصیت، هیستریک گفته می شد؟

۱. ضد اجتماعی      ۲. مرزی      ۳. خودشیفته      ۴. نمایشی

۲۴- مکانیسم دفاعی در کدام اختلال شخصیت، جداسازی است و همه چیز را به کاملاً خوب یا کاملاً بد تقسیم می کند؟

۱. پارانوئید      ۲. دوری گزین      ۳. مرزی      ۴. اسکیزوئید

۲۵- به کدام مورد اختلال شخصیت منفی گرا گفته می شود؟

۱. وسواسی - جبری      ۲. پارانوئید      ۳. افسرده      ۴. منفعل پرخاشگر

۲۶- کدام یک از مراحل خواب non-REM، خواب عمیق نامیده می شود؟

۱. سوم و چهارم      ۲. دوم و سوم      ۳. اول و دوم      ۴. اول و سوم

۲۷- اولین دور از خواب REM معمولاً چه مدت بعد از به خواب رفتن رخ می دهد؟

۱. نیم ساعت تا یک ساعت      ۲. یک ساعت تا یک ساعت و نیم

۳. دو ساعت تا دو ساعت و نیم      ۴. یک ربع تا یک ساعت

۲۸- کدام مورد به نابهنجاری های همراه خواب مربوط است؟

۱. بد خوابی      ۲. بی خوابی اولیه      ۳. حمله خواب      ۴. کابوس

۲۹- درمان کدام مورد از مشکل ترین مسائل در اختلالات خواب است؟

۱. بی خوابی اولیه      ۲. اختلال خواب مرتبط با تنفس

۳. حمله خواب      ۴. وحشت شبانه

۳۰- اصلی ترین ملاک تشخیص در کدام اختلال، حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز به مدت حداقل ۳ ماه است؟

۱. پر خوابی اولیه      ۲. ناركولپسی      ۳. خواب گردی      ۴. کاتاپلکسی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰

۳۱- مهمترین داروی درمان وحشت شبانه و خوابگردی چیست؟

۱. ضد افسردگی ۰۲. زولپیدم ۰۳. داروهای سه حلقه ای ۰۴. دیازپام

۳۲- مشکل در پاسخ جنسی را چه می نامند؟

۱. پارافیلیاها ۰۲. بدکارکردی های جنسی  
 ۰۳. اختلال هویت جنسی ۰۴. تحریک جنسی

۳۳- کدام درمان توسط مسترز و جانسون در رابطه با مشکل نعوظی مطرح شد؟

۰۱. تمرکز بر آمادگی پذیرش حسی ۰۲. پیش نظاره گری خویشتن  
 ۰۳. تغییر تخیلات جنسی ۰۴. وابستگی تخیلی جنسی

۳۴- در کدام اختلال جنسی افراد معتقدند که با جنسیت غلط به دنیا آمده اند؟

۰۱. مبدل پوشی ۰۲. هویت جنسی  
 ۰۳. بدکارکردی های جنسی ۰۴. یادگارخواهی جنسی

۳۵- در کدام اختلال، فرد با رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رسان نسبت به موضوع جنسی خود به برانگیختگی جنسی می رسد؟

۰۱. نمایشگری جنسی ۰۲. تماشاگری جنسی ۰۳. سادیسم جنسی ۰۴. مازوخسیم جنسی

۳۶- مهمترین نظریه های پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدامند؟

۰۱. شرطی شدن در مراحل اولیه زندگی ۰۲. اضطراب جدایی مفرط اولیه  
 ۰۳. آشفتنگی هورمون های جنسی ۰۴. جلب رضایت و توجه مفرط فرزندان توسط مادر

۳۷- بر اساس نظر مسترز و جانسون رایج ترین علت مربوط به اختلال نعوظی چیست؟

۰۱. جسمانی ۰۲. روان شناختی ۰۳. یادگیری ۰۴. هورمونی

۳۸- حدود چند درصد از جمعیت عمومی مبتلا به اختلال شخصیت مرزی هستند؟

۰۱. یک درصد ۰۲. دو درصد ۰۳. سه درصد ۰۴. پنج درصد

۳۹- کدام اختلال در ICD-10 تحت عنوان اختلال شخصیت مضطرب مطرح شده است؟

۰۱. مرزی ۰۲. وابسته ۰۳. وسواسی - جبری ۰۴. دوری گزین



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۳۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰

۴۰- کدام دسته از داروها جهت کاهش و کنترل دوره های پرخاشجویی تکانشی مفیدند؟

۱. باریتورات ها - لیتیوم

۲. بازدارنده جذب مجدد سروتونین- ال دو پا

۳. لیتیوم - بازدارنده جذب مجدد سروتونین

۴. محرک ها- ال دو پا

١\_١٢١٧٢٤-١٢١٧-٦١\_١٢١٧-٢٩\_١٢١١-٩٨\_

آسيب شناسی روانی ٢ نيمسال اول سال تحصيل ٩٨-٩٧

شماره سوال	الف	ب	ج	د	پاسخ صحيح	وضعييت كليد
١					الف	عادي
٢					الف	عادي
٣					الف	عادي
٤					الف	عادي
٥					د	عادي
٦					ج	عادي
٧					الف	عادي
٨					د	عادي
٩					الف	عادي
١٠					ب	عادي
١١					الف	عادي
١٢					ج	عادي
١٣					د	عادي
١٤					ج	عادي
١٥					ب	عادي
١٦					د	عادي
١٧					د	عادي
١٨					د	عادي
١٩					ج	عادي
٢٠					د	عادي
٢١					الف	عادي
٢٢					ب	عادي
٢٣					د	عادي
٢٤					ج	عادي
٢٥					د	عادي
٢٦					الف	عادي
٢٧					ب	عادي
٢٨					د	عادي
٢٩					الف	عادي
٣٠					ب	عادي
٣١					د	عادي
٣٢					ب	عادي
٣٣					الف	عادي
٣٤					ب	عادي
٣٥					ج	عادي
٣٦					الف	عادي
٣٧					ب	عادي
٣٨					ب	عادي
٣٩					د	عادي
٤٠					ج	عادي

98-1

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی  
روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰، مشاوره ۱۳۱۷۰۶۱ -

- ۱- نشانه اصلی اختلالات خلقی چیست؟
۱. افسردگی ۰۲ هذیان ۰۳ توهم ۰۴ بی قراری
- ۲- کدام نوع افسردگی براساس زمان و دوره عود آن را مشخص می گردد؟
۱. تک قطبی ۰۲ پس از زایمان ۰۳ مضاعف ۰۴ اساسی
- ۳- حالت خفیف تر اختلال دو قطبی کدام گزینه است؟
۱. افسرده خوبی ۰۲ ادواری خوبی ۰۳ افسردگی تک قطبی ۰۴ افسردگی اساسی
- ۴- فلج ارادی جزء کدام یک از نشانه های افراد افسرده است؟
۱. شناختی ۰۲ فیزیولوژیکی ۰۳ زیست شناختی ۰۴ انگیزشی
- ۵- در کدام حالت افسردگی افزایش وزن دیده می شود؟
۱. متوسط ۰۲ شدید ۰۳ خفیف ۰۴ اساسی
- ۶- کدام نوع افسردگی را بدون مایخولیا می نامند؟
۱. درون زاد ۰۲ مضاعف ۰۳ برون زاد ۰۴ خفیف
- ۷- پایین آمدن سطح کدام یک از انتقال دهنده های زیر باعث بروز افسردگی می شود؟
۱. دوپامین ۰۲ اپی نفرین ۰۳ استیل کولین ۰۴ سروتونین
- ۸- مهمترین ناحیه دخیل در افسردگی کدام یک از گزینه های زیر است؟
۱. لیمبیک ۰۲ آمیگدال ۰۳ تالاموس ۰۴ هیپوتالاموس
- ۹- طبق نظریه فروید فرد افسرده در طی دوره غمگینی به کدام مرحله برگشت می کند؟
۱. مقعدی ۰۲ دهانی ۰۳ نهفتگی ۰۴ تناسلی
- ۱۰- احساس گرسنگی مربوط به کدام قسمت مغز است؟
۱. هیپوتالاموس جانبی ۰۲ هیپوتالاموس شکمی ۰۳ تالاموس ۰۴ هیپوفیز
- ۱۱- از نظر کراپلین دوران طولانی ناتوانی شدید اجتماعی از مشخصات کدام یک از بیماری های زیر است؟
۱. اسکیزوفرنی آشکار ۰۲ افسردگی ۰۳ جنون زودرس ۰۴ اسکیزوفرنی پنهان



تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰، تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰

۱۲- فقدان هذیان، گفتار آشفته و کاتاتونیک از نشانه های کدام نوع اختلال اسکیزوفرنی می باشد؟

۱. آشفته ۰۲. باقی مانده ۰۳. کاتاتونیک ۰۴. پارانوئید

۱۳- شروع بیماری اسکیزوفرنی بین چه سنی صورت می گیرد؟

۱. 20-39 ۰۲. 20-26 ۰۳. 20-28 ۰۴. 26-32

۱۴- مشغولیت ذهنی در مورد مقررات و جزئیات، فقدان انعطاف پذیری، کمال گرایی، احتکار اشیاء، حساسیت جزء کدام یک از اختلالات شخصیت زیر می باشد؟

۰۱. دوری گزین ۰۲. پارانوئید  
 ۰۳. نمایشی ۰۴. وسواسی - اجباری

۱۵- اجتناب از روابط نزدیک، انتخاب فعالیت های انفرادی و سردی هیجانی از مشخصه های کدام اختلال است؟

۰۱. اسکیزوتایپال ۰۲. دوری گزین ۰۳. مرزی ۰۴. اسکیزوئید

۱۶- کدام یک از عوامل زیر از نشانه های اختلال شخصیت ضد اجتماعی است؟

۰۱. روان رنجورخوبی پایین ۰۲. برون گرایی بالا  
 ۰۳. هم رایب بالا ۰۴. جدیت بیشتر

۱۷- تمایل به فکر و خیال و نگرانی، بدبینی و احساس گناه و پشیمانی از ویژگی های اصلی کدام اختلال است؟

۰۱. متفعل پرخاشگر ۰۲. افسرده ۰۳. دوری گزین ۰۴. پارانوئید

۱۸- معمولاً اوج سن ابتلا به بی اشتهايي روانی در زنان کدام است؟

۰۱. 40 به بالا ۰۲. 18 تا 40  
 ۰۳. 20 تا 25 ۰۴. 14 تا 18

۱۹- فرد باید چند درصد از وزن خود را از دست بدهد تا به مراقبت های خاص نیاز داشته باشد؟

۰۱. ۷۰٪ ۰۲. ۵۰٪ ۰۳. ۳۰٪ ۰۴. ۲۵٪

۲۰- تغذیه مجدد مربوط به کدام رویکرد درمانی اختلال تغذیه ای می باشد؟

۰۱. شناختی رفتاری ۰۲. خانواده درمانی ۰۳. رفتار درمانی ۰۴. بینش درمانی

۲۱- کودکانی که دچار شب ادراری یا راه رفتن حین خواب هستند در کدام مرحله مشکل دارند؟

۰۱. اول و دوم ۰۲. دوم و سوم ۰۳. سوم و چهارم ۰۴. اول و چهارم

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰

۲۲- کدام یک از ناپهنجاری های زیر جزء اختلال هایی که در حین خواب روی می دهند؟

۱. کابوس      ۲. پر خوابی      ۳. بی خوابی      ۴. حمله خواب

۲۳- کاتاپلکسی چیست؟

۱. خشک زدگی      ۲. توهم های پس از خواب  
 ۳. توهم های پیش از خواب      ۴. فلج خواب

۲۴- خواب متناقض بعد از کدام مرحله رخ می دهد؟

۱. اول      ۲. دوم      ۳. سوم      ۴. چهارم

۲۵- تفاوت وحشت شبانه و کابوس در چیست؟

۱. در وحشت شبانه فرد با ترس فراوان از خواب بیدار می شود و اغلب رویای دیده شده را به خاطر می آورد.  
 ۲. در وحشت شبانه فرد به طور معمولی از خواب بیدار می شود ولی وحشت زیادی را تجربه کرده و رویای دیده شده را به خاطر نمی آورد.  
 ۳. در وحشت شبانه فرد با ترس فراوان از خواب بیدار شده اما رویای دیده شده را به خاطر نمی آورد.  
 ۴. در وحشت شبانه فرد به طور معمولی از خواب بیدار شده ولی وحشت زیادی را تجربه کرده و رویای دیده شده را به خاطر می آورد.

۲۶- به تمایل فرد به رابطه جنسی با اشیاء چه گفته می شود؟

۱. پدوفیلیا      ۲. پارافیلیا      ۳. سادیسم جنسی      ۴. بیزاری جنسی

۲۷- به مجموعه ای از اختلالات که با مشکل در واکنش جنسی همراه است چه می گویند؟

۱. بدکارکردی جنسی      ۲. اعتیاد جنسی      ۳. بیزاری جنسی      ۴. اختلال نعوظ

۲۸- کدام یک از اختلالات زیر جزء اختلالات میل جنسی است؟

۱. اختلالات نعوظ      ۲. انزال زودرس  
 ۳. اختلال اوج لذت جنسی      ۴. اختلال بیزاری جنسی

۲۹- انقباض غیرارادی قسمت خارجی اندام تناسلی زن چه نامیده می شود؟

۱. مقاربت دردناک      ۲. واژینیسم      ۳. درد جنسی      ۴. سرد مزاجی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰

- ۳۰- مهمترین دارویی که برای درمان اختلال نعوظ به کار برده می شود چیست؟  
 ۱. زالپون ۲. بنزودپازین ۳. سیلدنافیل ۴. سیپروهیپادین
- ۳۱- درمانگر برای درمان کدام اختلال از شوک الکتریکی استفاده می کند؟  
 ۱. مبدل پوشی ۲. پارافیلیا ۳. پدوافیلیا ۴. سادیسم جنسی
- ۳۲- مرحله اول جراحی اختلال هویت جنسی شامل کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟  
 ۱. جراحی متمرکز به صفات اولیه ۲. تزریق پروژسترون  
 ۳. تزریق تسترون ۴. تزریق هورمون جنس مخالف
- ۳۳- آسیب دیدن توانایی ها برای انجام اعمال هدف مند علیرغم سالم بودن کارکردهای حرکتی چه می نامند؟  
 ۱. آمنزیا ۲. آفازیا ۳. اگنوزیا ۴. آپراکسیا
- ۳۴- عدم تشخیص اشیاء علیرغم سالم بودن کارکردهای حسی چه نامیده می شود؟  
 ۱. آفازیا ۲. آپراکسیا ۳. آمنزیا ۴. آگنوزیا
- ۳۵- در مرحله نهایی بیماری آلزایمر کدام یک از گزینه های زیر اتفاق می افتد؟  
 ۱. حافظه پیش گستر از بین می رود. ۲. گفتار دچار مشکل می شود.  
 ۳. حافظه پس گستر از بین می رود. ۴. هیجان آسیب می بیند.
- ۳۶- کدام یک از جفت ژن های زیر در ابتلاء به بیماری آلزایمر دخالت دارند؟  
 ۱. ۱۴-۱۹-۲۰ ۲. ۱۴-۱۸-۲۰ ۳. ۱۴-۱۹-۲۱ ۴. ۱۴-۱۸-۲۱
- ۳۷- مهمترین انتقال دهنده عصبی که به بیماری آلزایمر مربوط است کدام است؟  
 ۱. استیل کولین ۲. آدرنالین ۳. سروتونین ۴. دوپامین
- ۳۸- کدام یک از اختلالات زیر می تواند فعالیت دستگاه ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار دهد؟  
 ۱. افسردگی ۲. فلج چندگانه ۳. آلزایمر ۴. استرس
- ۳۹- فقدان سلول های رنگدانه ای در جسم سیاه و هسته رنگی مغز در کدام بیماری دیده می شود؟  
 ۱. مالتیپل اسکلروزیس ۲. پارکینسون ۳. هانتینگتون ۴. دمانس

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰

۴۰- دومین اختلال شایع عصب شناختی کدام است؟

۰۴. پارکینسون

۰۳. آلزایمر

۰۲. سکته

۰۱. صرع

عادي	د			X		1
عادي	الف	X				2
عادي	ب				X	3
عادي	ج		X			4
عادي	ب				X	5
عادي	الف	X				6
عادي	د		X			7
عادي	ج	X				8
عادي	الف			X		9
عادي	ب			X		10
عادي	د	X				11
عادي	ج			X		12
عادي	الف				X	13
عادي	ب				X	14
عادي	الف				X	15
عادي	د	X				16
عادي	ج		X			17
عادي	ب	X				18
عادي	الف	X				19
عادي	د				X	20
عادي	ب			X		21
عادي	ج		X			22
عادي	الف				X	23
عادي	د	X				24
عادي	ب			X		25
عادي	ج	X				26
عادي	الف				X	27
عادي	د	X				28
عادي	ج			X		29
عادي	الف				X	30

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
سری سوال: یک ۱  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی  
روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰ - ۱۳۱۷۰۶۱

- ۱- DSM-IV کدام نوع افسردگی را افسردگی بدون مالیخولیا می نامد؟
۱. افسردگی درون زاد      ۲. افسردگی برون زاد      ۳. افسردگی مضاعف      ۴. افسردگی یک قطبی
- ۲- نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟
۱. سلیگمن      ۲. مزلو      ۳. بک      ۴. آلپس
- ۳- کدام گزینه جزء نشانه های شناختی افسردگی است؟
۱. احساس حقارت و بی کفایتی      ۲. فلج ارادی  
۳. کندهی در رفتار و گفتار      ۴. نظر مثبت نسبت به دیگران
- ۴- با توجه به نظریه "درماندگی آموخته شده" افسردگی حاصل سه اسناد برای رویداد منفی است که ..... باشد.
۱. پایدار - درونی - کلی      ۲. پایدار - بیرونی - جزئی  
۳. ناپایدار - درونی - کلی      ۴. ناپایدار - بیرونی - جزئی
- ۵- سن معمول برای شروع یک دوره افسردگی کدام است؟
۱. 30 تا 35 سالگی      ۲. 24 تا 29 سالگی      ۳. 18 تا 24 سالگی      ۴. 35 تا 40 سالگی
- ۶- کدام یک از موارد زیر جزء دسته داروهای ضد افسردگی بازدارنده های مونوآمینو اکسیداز هستند؟
۱. آمی تریپتیلین      ۲. فنلزین      ۳. سرتالین      ۴. پروکستین
- ۷- کدام مورد جزء عوامل خطر ساز برای خودکشی است؟
۱. جنسیت مونث      ۲. تاهل      ۳. حافظه آسیب دیده      ۴. خواب زیاد
- ۸- هورمونی که معمولاً در مغز میانی و هیپوتالاموس یافت می شود و در ابتلا به اختلال عاطفی فصلی دخیل می باشد کدام است؟
۱. ملاتونین      ۲. سروتونین      ۳. نوراپی نفرین      ۴. اکسی توسین
- ۹- کدام یک از موارد زیر جزء نشانه های افراد مانیایی است؟
۱. آرام صحبت می کنند.      ۲. ناکامی را خودشان تجربه می کنند.  
۳. قضاوت قوی دارند.      ۴. پر زرق و برق هستند.
- ۱۰- کدام یک جزء نشانه های اسکیزوفرنیا که بلولر عنوان کرده است ، می باشد؟
۱. توهم      ۲. آشفتگی تداعی ها      ۳. هذیان      ۴. فقدان عاطفه

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک  
عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی (۱۳۱۷۰۶۱) - روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰

۱۱- کدام گزینه جزء نشانه های اسکیزوفرنیا بر اساس تشخیص DSM است؟

۱. رفتار منظم      ۲. توهم و هذیان      ۳. گفتار سلیس      ۴. پرحرفی

۱۲- شایع ترین نوع اسکیزوفرنی کدام است؟

۱. آشفته      ۲. پارانوئید      ۳. کاتاتونیک      ۴. باقی مانده

۱۳- درمان اسکیزوفرنیا با کلوزاپین ممکن است چه عوارضی داشته باشد؟

۱. خواب آلودگی      ۲. دیرشن      ۳. آگرانولوسیتوسیز      ۴. افزایش وزن

۱۴- کدام یک از موارد زیر در درمان اسکیزوفرنیا، دارو درمانی را بهبود می بخشد؟

۱. خانواده درمانی      ۲. مدیریت استرس      ۳. گروه درمانی      ۴. تغییر باورها

۱۵- مدل شبیه نظریه فروم ریچمن در مورد اسکیزوفرنیا چیست؟

۱. نظریه دوسوکور      ۲. نظریه ذهن      ۳. نظریه علت اجتماعی      ۴. نظریه راندگی اجتماعی

۱۶- کدام یک از گروه های زیر بیشتر در معرض ابتلا به اسکیزوفرنیا هستند؟

۱. متولدین ماه های بهار      ۲. متولدین ماه های تابستان      ۳. متولدین ماه های پاییز      ۴. متولدین ماه های زمستان

۱۷- مصرف کدام یک از موارد زیر در بروز اسکیزوفرنی دخالت دارد؟

۱. کوکائین      ۲. هروئین      ۳. مورفین      ۴. حشیش

۱۸- مشهودترین نشانه اسکیزوفرنی کدام است؟

۱. آشفتگی در فرآیندهای تفکر      ۲. انزوای اجتماعی      ۳. افکار هزیانی      ۴. توهم شنیداری

۱۹- نقطه اوج سن شروع اسکیزوفرنی در زنان در چند سالگی است؟

۱. 20-26 سالگی      ۲. 26-32 سالگی      ۳. 32-39 سالگی      ۴. 39-45 سالگی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰

۲۰- کر تکس پره فرونتال دور سولاترال راست در بیماران اسکیزوفرنی کاهش فعالیت در کدام حافظه را نشان می دهد؟

۱. حافظه کوتاه مدت، حافظه کاری  
 ۲. حافظه بلندمدت  
 ۳. حافظه کاری، حافظه بلند مدت  
 ۴. حافظه کاری

۲۱- کدام مناطق مغزی در اسکیزوفرنی تحت تاثیر قرار ی گیرند؟

۱. لوب های پیشانی  
 ۲. هیپوتالاموس  
 ۳. تالاموس  
 ۴. لوب پس سری

۲۲- کدام یک از این داروها برای درمان نشانه های منفی اسکیزوفرنی موفق تر عمل کرده است؟

۱. کلوزاپین  
 ۲. هالوپریدول  
 ۳. کلرپرومازین  
 ۴. ایمی پرامین

۲۳- درمان شناختی- رفتاری اسکیزوفرنی شامل چه درمان هایی است؟

۱. دارو درمانی  
 ۲. نظر به تاریخچه زندگی فرد و مشکلات شخصیتی  
 ۳. خانواده درمانی  
 ۴. مدیریت استرس و تغییر باورها

۲۴- در کدام اختلال شخصیتی فرد مبتلا هیجانی و پر زرق و برق می باشد؟

۱. دوری گزینی  
 ۲. ضد اجتماعی  
 ۳. پارانوئید  
 ۴. اسکیزوئید

۲۵- کدام اختلال در مردان شایع تر است؟

۱. نمایشی  
 ۲. مرزی  
 ۳. خودشیفته  
 ۴. اسکیزوتایپال

۲۶- کدام مورد جزء مشخصه های اصلی تشخیص اختلال نمایشی است؟

۱. تجربه هیجانی سطحی  
 ۲. روابط بی ثبات  
 ۳. نیاز شدید به محبت  
 ۴. ترس از مخالفت با دیگران

۲۷- افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید از کدام مکانیسم دفاعی استفاده می کنند؟

۱. جبران  
 ۲. فرافکتی  
 ۳. واپس روی  
 ۴. جداسازی

۲۸- کدام اختلال از جوانی شروع می شود و به آن اختلال شخصیت منفی گرا نیز می گویند؟

۱. منفعل پرخاشگر  
 ۲. افسرده  
 ۳. وابسته  
 ۴. وسواسی-جبری

۲۹- کدام مورد از شایع ترین اختلال های شخصیت در کلینیک های روانی است؟

۱. وابسته  
 ۲. وسواسی-جبری  
 ۳. مرزی  
 ۴. ضد اجتماعی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰، تشریحی: ۰  
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰، تشریحی: ۰  
 سری سوال: ۱ یک  
 عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2  
 رشته تحصیلی/گد فرس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰

۳۰- افراد مبتلا به این اختلال احتمالاً بیشتر از افراد دیگر به دوره ای از اسکیزوفرنی مبتلا می شوند؟

۱. هیستریونیک      ۲. اسکیزوتایپال      ۳. اسکیزوئید      ۴. پارانوئید

۳۱- از بین رفتن دوره های ماهانه (آمنوریا) از پیامدهای کدام مورد است؟

۱. چاقی      ۲. بی اشتهایی روانی  
 ۳. پراشتهایی روانی      ۴. اختلال خواب

۳۲- کدام قسمت مغز موجب سیری می شود؟

۱. تالاموس      ۲. هیپوتالاموس جانبی      ۳. هیپوتالاموس شکمی      ۴. هیپوفیز

۳۳- شیوع پراشتهایی روانی در چند درصد جمعیت عمومی گزارش شده است؟

۱. 2 درصد      ۲. 5 درصد      ۳. 0/5 تا 1 درصد      ۴. 10 درصد

۳۴- در تبیین نظریه پردازان فرویدی، در مورد مبتلایان به پراشتهایی روانی و بی اشتهایی روانی به ترتیب کدام موارد صحیح است؟

۱. فاقد کنترل خود- فاقد قدرت فراخود      ۲. فاقد کنترل نهاد- فاقد قدرت فراخود  
 ۳. فاقد قدرت خود- فاقد کنترل فراخود      ۴. فاقد کنترل فراخود- فاقد قدرت خود

۳۵- روان تحلیلگران برای درمان پراشتهایی روانی میل به عینی سازی کدام مکانیسم های دفاعی دارند؟

۱. درون فکنی و برون فکنی      ۲. واپس روی و انکار  
 ۳. جبران و سرکوب      ۴. واکنش وارونه و فرافکنی

۳۶- خواب چند مرحله کلی و اختصاصی دارد؟

۱. 3 مرحله کلی و 4 مرحله اختصاصی      ۲. 2 مرحله کلی و 5 مرحله اختصاصی  
 ۳. 2 مرحله کلی و 4 مرحله اختصاصی      ۴. 3 مرحله کلی و 5 مرحله اختصاصی

۳۷- مهمترین درمان نارکولپسی چیست؟

۱. دارودرمانی      ۲. مداخلات خانوادگی  
 ۳. درمان های شناختی رفتاری      ۴. شوک درمانی

۳۸- کدام یک از داروهای زیر برای درمان پراشتهای روانی موثر واقع شده است؟

۱. فلوکستین      ۲. آنتی هیستامین      ۳. ایمی پرامین      ۴. سرتالین



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰

۳۹- مهمترین نظریه پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام است؟

۱. شناختی      ۲. شرطی شدن      ۳. روان تحلیل گری      ۴. زیست شناختی

۴۰- مهمترین انتقال دهنده عصبی که به بیماری آلزایمر مربوط است کدام است؟

۱. استیل کولین      ۲. سروتونین      ۳. دوپامین      ۴. اکسی توسین

pdf.1\_1217240\_1217061\_1217029\_1211098\_

آسیب شناسی روانی ۲ نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

شماره سؤالی	الف	ب	ج	د	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1					ب	عادي
2					الف	عادي
3					الف	عادي
4					الف	عادي
5					ب	عادي
6					ب	عادي
7					ب	عادي
8					الف	عادي
9					د	عادي
10					ب	عادي
11					ب	عادي
12					ب	عادي
13					ب	عادي
14					الف	عادي
15					الف	عادي
16					د	عادي
17					الف	عادي
18					الف	عادي
19					ب	عادي
20					ب	عادي
21					الف	عادي
22					الف	عادي
23					د	عادي
24					ب	عادي
25					ب	عادي
26					الف	عادي
27					ب	عادي
28					الف	عادي
29					الف	عادي
30					ب	عادي
31					ب	عادي
32					ب	عادي
33					ب	عادي
34					د	عادي
35					الف	عادي
36					ب	عادي
37					الف	عادي
38					الف	عادي
39					ب	عادي
40					الف	عادي

99

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی، آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۳۱۷۰۶۱ - مطالعات خانواده ۱۳۱۷۱۶۴ - روانشناسی، مشاوره ۱۳۱۷۲۴۰ - مشاوره ۱۳۱۷۵۰۱ - مشاوره ۱۳۱۷۰۶۱

۱- حالت خفیف اختلال دوقطبی چه نوع اختلالی است؟

۱. افسردگی درون زاد      ۲. افسرده خوبی      ۳. اختلال ادوار خوبی      ۴. مانیا

۲- مدت زمان اختلال افسرده خوبی کدام گزینه می باشد؟

۱. 1 سال      ۲. 2 سال      ۳. 2 هفته      ۴. 1 ماه

۳- اختلال در سیکل ماهانه عادی در زنان افسرده مربوط به کدام نوع نشانه است؟

۱. نشانه فیزیولوژیکی      ۲. نشانه انگیزشی      ۳. نشانه شناختی      ۴. نشانه رفتاری

۴- وقتی فرد افسرده احساسات خود را نسبت به فرد مورد علاقه به خودش برمی گرداند و منجر به تنفر از خویشتن میشود این تبیین از افسردگی مربوط به کدام دیدگاه روانشناختی است؟

۱. رفتاری      ۲. انسان گرایی      ۳. شناختی      ۴. روان تحلیلی

۵- وجود حداقل یه دوره افسردگی اساسی و سه نشانه به مدت 4 روز در یک دوره هیپومانیا مربوط به کدام نوع اختلال است؟

۱. دوقطبی نوع 1      ۲. دوقطبی نوع 2      ۳. اختلال خلق ادواری      ۴. اختلال ملال پیش از قاعدگی

۶- انتقال دهنده هایی که در اختلال افسردگی نقش دارند ، کدامند؟

۱. دوپامین - نوراپی نفرین      ۲. گابا - سروتونین      ۳. استیل کولین - گابا      ۴. سروتونین - نوراپی نفرین

۷- از نظر سلیگمن وقتی فرد یاد می گیرد محیط فیزیکی یا اجتماعی خارج از کنترل شخصی اوست چه حالت روانی پیش می آید؟

۱. مانیک دپرسیو      ۲. دوره هایی از خلق ادواری      ۳. اختلال دوقطبی      ۴. درماندگی آموخته شده

۸- وقتی فردی ادعای تحت تعقیب بودن به وسیله موجودات مریخی دارد یا فردی که فکر می کند اگر انگشت اشاره خود را تکان دهد کره زمین منفجر خواهد شد مبتلا به کدام اختلال روانی است؟

۱. افسردگی      ۲. اسکیزوفرنی      ۳. مانیا      ۴. دوقطبی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی، آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مطالعات خانواده ۱۲۱۷۱۶۴ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰ - مشاوره ۱۲۱۷۵۰۱

۹- نشانه های درجه اول در اختلال اسکیزوفرنی توسط چه کسی مطرح گردید؟

۱. اشنایدر      ۲. بلولر      ۳. کراپلین      ۴. سلیگمن

۱۰- باور به اینکه فرد ثروتمند، مشهور و با استعداد است، چه نوع هذیانی است؟

۱. اروتومانیا      ۲. انتساب      ۳. بزرگ منشی      ۴. پوچ گرایانه

۱۱- در کدام نوع اختلال نشانه ها به مدت حداقل یک روز یا کمتر از یک ماه رخ می دهند؟

۱. اسکیزوفرنی      ۲. اسکیزوفرنی فرم      ۳. اختلالات سایکوز گذرا      ۴. اسکیزوافکتیو

۱۲- مصرف کدام ماده سطوح دوپامین را افزایش می دهد و می تواند منجر به تجاربی مشابه با نشانه های مثبت اسکیزوفرنی شود؟

۱. آمفتامین      ۲. تریاک      ۳. حشیش      ۴. الکل

۱۳- مهمترین اثر مصرف داروهای ضد روانپریشی کدام گزینه است؟

۱. یاس و ناامیدی      ۲. چاقی      ۳. درمان قطعی      ۴. تسکین

۱۴- سن تشخیص اختلالات شخصیت کدام گزینه می باشد؟

۱. 18      ۲. 15      ۳. 20      ۴. 12

۱۵- الگوی فراگیری از کناره گیری از روابط اجتماعی و یک طیف محدودی از ابراز هیجانات در موقعیت های بین فردی مربوط به کدام نوع اختلال شخصیت است؟

۱. پارانوئید      ۲. ضد اجتماعی      ۳. اسکیزوتایپال      ۴. اسکیزوئید

۱۶- کدام اختلال در خوشه دوم اختلالات شخصیت که در جنبه هیجانی و ابراز آن مشکل دارند وجود دارد؟

۱. ضد اجتماعی      ۲. وسواسی      ۳. دوری گزین      ۴. اسکیزوئید

۱۷- خشم شدید و نامتناسب یا مشکل در کنترل خشم و احساسات مزمنی از خالی بودن از نشانه های کدام اختلال شخصیت می باشد؟

۱. مرزی      ۲. پارانوئید      ۳. ضد اجتماعی      ۴. هیستری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی، آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰ - مشاوره ۱۲۱۷۵۰۱  
۱۲۱۷۰۶۱ - مطالعات خانواده ۱۲۱۷۱۶۴ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰ - مشاوره ۱۲۱۷۵۰۱

۱۸- افراد مبتلا به کدام اختلال شخصیت از انجام خشونت های فیزیکی و اهانت های کلامی که باعث ایجاد درد جسمی و روانی در دیگران می شود لذت می برند؟

۱. مازوخیستی      ۲. سادیستی      ۳. ضد اجتماعی      ۴. مرزی

۱۹- درمان های بینشی و درمان هایی که ترس و اضطراب را کاهش می دهند می توانند برای کدام نوع اختلال شخصیتی کمک کننده باشند؟

۱. وسواسی-جبری      ۲. اسکیزوتایپال      ۳. پارانوئید      ۴. مرزی

۲۰- خوردن یک یا چند ماده غیر غذایی در طی حداقل یک ماه مربوط به کدام نوع اختلال است؟

۱. بی اشتهایی عصبی      ۲. چاقی      ۳. هرزه خواری      ۴. نشخوار

۲۱- از بین رفتن دوره های آمنوریا در خانم ها مربوط به کدام نوع اختلال است؟

۱. بی اشتهایی عصبی      ۲. مانیا      ۳. اسکیزوفرنی      ۴. پر اشتهایی عصبی

۲۲- یادگیری رفتارها و نگرش های مربوط به خوردن یا کنترل آنها مربوط به تبیین اختلالات خوردن از چه دیدگاهی است؟

۱. شناختی      ۲. رفتاری      ۳. روان تحلیلی      ۴. انسان گرایی

۲۳- شکایت مبنی بر عدم رضایت از کمیت و کیفیت خواب و حداقل 3 شب در هفته و بیش از 1 ماه، از نشانه های کدام اختلال خواب است؟

۱. پر خوابی      ۲. خواب گردی      ۳. نارکولپسی      ۴. بی خوابی

۲۴- به رویاهای معمولاً طولانی که موجب اضطراب و ترس شدید می گردند، گفته می شود؟

۱. کابوس      ۲. آپنه      ۳. خواب گردی      ۴. پاهای بیقرار

۲۵- به دسته ای از اختلالات جنسی که فرد برای ارضای نیاز جنسی خود علاقه مند به روش هایی است که برای خود دیگران و جامعه زیانبار است؟

۱. بد کارکردی جنسی      ۲. نارضایتی جنسی      ۳. هویت جنسی      ۴. پارافیلیاها

۲۶- کدام اختلال جنسی فقط مختص زنان است؟

۱. واژینیسم      ۲. مقاربت درد ناک      ۳. میل جنسی      ۴. مبدل پوشی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی، آسیب شناسی روانی 2

رشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - مطالعات خانواده ۱۲۱۷۱۶۴ - روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۴۰ - مشاوره ۱۲۱۷۵۰۱

۲۷- وقتی فردی از دختر بودن یا پسر بودن خود خشنود نیست احتمالاً به کدام اختلال مبتلا است؟

۱. مبدل پوشی جنسی  
۲. اختلال نارضایتی جنسی  
۳. اختلال یادگار خواهی جنسی  
۴. اختلال مازوخیسم

۲۸- کدام اختلال فرایند های شناختی نظیر حافظه، تفکر، جهت یابی، درک و فهم، محاسبه، توانایی یادگیری، زبان و قضاوت را تحت تاثیر قرار می دهد؟

۱. هانتینگتون  
۲. دمانس  
۳. پارکینسون  
۴. رعشه

۲۹- کدام ماده شیمیایی آغازگر رها شدن استیل کولین است و موجب بهبودی حافظه و باعث بهبودی در تکالیف شناختی کوتاه مدت بیماران آلزایمر می باشد؟

۱. آمفتامین  
۲. الکل  
۳. تریاک  
۴. نیکوتین

۳۰- جراحی دوطرفه مغز از مهمترین جراحی ها برای کنترل و جلوگیری از انتقال تشنجات از یک نیمکره به نیمکره دیگر در کدام بیماری است؟

۱. آلزایمر  
۲. پارکینسون  
۳. صرع  
۴. دمانس

## 1401-1402-2

1217240	01-2
باسخ صحيح	شماره سوال
ج	1
ب	2
الف	3
د	4
ب	5
د	6
د	7
ب	8
الف	9
ج	10
ج	11
الف	12
د	13
الف	14
د	15
الف	16
الف	17
ب	18
الف	19
ج	20
الف	21
ب	22
د	23
الف	24
د	25
الف	26
ب	27
ب	28
د	29
ج	30